




Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3222/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3222/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3222/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3222/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3222/A

A. ix. 0. 1

157 Source

Q

3223

A

G. A. POYNDEE
ANTIQUARIAN BOOK-SHOP,
NEXT TO GENERAL POST OFFICE,
READING.


9. [295]

9C. 57 24669

A2902.

3222

Pygmalion
10/10.



HIPPOCRATIS

COI

APHORISMORUM
SECTIONES OCTO;

Ex Interpretatione

ANUTII FOESII

Quibus accessit


METHODUS.

Qua Aphorismi, in certum or-
dinem digesti, & accurate
dispositi, exhibentur

A

IOANNE ERNESTO SCHEFFLER,

Phil. & Med. Doct.



LUGDUNI BATAVORUM

Ex Officinâ IOANNIS MAIRE,

MDCCXXXIII.



Lib
IOA
BAN
SCH



his intro
tu paxtan
m de om
medica
xerunt, co
gestari, m
mteatur.

Lectori benevolis

I O A N N E S

E R N E S T U S

S C H E F F L E R

S. P.



A N T A est
exigui hu-
jus volumi-
nis, rebus
usui medi-
co necessa-

riis instructi, gravitas, tan-
ta præstantia, atq; utilitas,
ut ab omnibus, qui arti
medicæ operâ suam addi-
xerunt, continenter circū-
gestari, manibusq; versari
mereatur. Eo enim ceu

A 2

com-

P R A E F A T I O .

compendio quodam, Medicinae parens, universam medicinam, factivam puta, complexus est; brevissimo quidem, & succincte, ita tamen obscure, & confuse ut non Galeni modo, sed aliorum illustrium medicorum, Leonici, Heurnii, Foësi, Hollerii, &c. interpretationibus, & clarissimis commentariis opus habuerit: unde tandem tantum ei lumen accessit, ut nullus obscuritati amplius locus videatur esse relictus. Atque hoc nomine, magnis illis, & de re medica optime meritis Heroibus magnae debentur

P R A E F A T I O.

tur gratia, majoresque deberentur, si gravissimis negotiis non distenti, confusione etiam, & fortuito Aphorismorum ordini, obviam aliquo modo ivissent, illosque ut perspicuitate, ita & methodo, quæ omnis bonæ disciplinæ anima, donassent, cum hanc non minus, quam illam exigere videantur. Nam stante hac confusione, sæpissime medicinæ sacratis, Aphorismum aliquem, certæ alicui materiæ medicæ accommodatum, quærentibus evenit, ut Aphorismorum libellum, diu, multumque vol-

A ; vant,

P R A E F A T I O .

vant, ac revolvant, nec
tamen desiderii sui com-
potes fiant: quod cum non
minus tediosum, quam la-
boriosum sit, huic malo
occurrere, & Aphorismos
in certam aliquam seriem,
ac ordinem redigere, ope-
ræ pretium, imo necessa-
rium arbitrabar; quo præ-
cipua theoremata, quæ
pro oraculis citari meren-
tur, de quavis artis mate-
ria separatim, ac seriatim
in promptu haberi queant.
Et certe debebatur huic
opusculo hic labor, quo
egregium, solidumque
corpus partibus omnibus
compleretur. Habes igitur,

tur,

P R A E F A T I O.

tur, Lector benevole, in
parvo hoc codicillo
(quod grāde alioquin vo-
lumen est, si rerum ponde-
ra spectes) Aphorismos,
imprimis sui nato, h. e.
fortuito, ordine disposi-
tos, textumque tam Græ-
cum, quā Latinum emen-
datissimum, tersissimum,
& accurate recognitum.
Habes præterea in calce
libelli, seriem, ac metho-
dum, veluti animulam
Aphorismorum, informi
ac indigesto corpusculo
applicatam, & adjunctam;
qua prædictos Aphori-
smos, pro variis Medici
operationibus, universos-

A 4

que

PRÆATIO.

que corporis affectus, in
certas classes dispositos,
digestos, & ordinatos ex-
hibui. Hoc contendens,
aliorum me vestigiis ma-
gnam partem instituisse lu-
bens fateor: quare vix
aliud in hac opella mihi
vendico præter studium &
laborem, quem tibi, tuis-
que commodis, ac totius
rei medicæ utilitati offe-
rendum duxi. Tuum erit
à Zoili insultibus eum de-
fendere, conatibus meis
favere, atque hæc exigua
æqui bonique consulere.

I' Π Π Q-

ἸΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ
Α'ΦΟΡΙΣΜΟΙ

APHORISMI
HIPPOCRATIS.

Γ' ΠΠΟΚΡΑΤΟΥΤΣ

Α' ΦΟΡΙΣΜΩΝ

Τμήμα πρώτοι.

Α'.

Ο βίος βραχύς, ἢ ὅ
 τέχνη μακρὴ, ὅ ὅ καί-
 εὖς ὀξύς, ἢ ὅ πᾶσα
 σφαλερὴ, ἢ ὅ κρείττε
 χαλεπή. δεῖ ὅ ἂ μόνον
 ἑαυτὸν παρέχει τὰ δεόντα ποιεῖ-
 τα, ἀλλὰ καὶ τ' νοσέοντα, καὶ τοῦ πα-
 ρέοντος, καὶ τὰ ἔξωθεν.

Β'. Εἴ τῇ πταραχῇ π τ' κοι-
 λίας, καὶ τοῖσιν ἐμέπεισι, τοῖσιν αὐ-
 τομάτως γινόμενοι πιν, ὡ μ οἶα
 δεῖ καθαίρειν καὶ καθαίρειν, ξυμ-
 φέρε

HIPPOCRATIS

APHORISMORUM

SECTIO PRIMA.

I.

VITA brevis, ars longa, occasio præceps, experientia fallax, iudicium difficile. Neque vero satis est, ad ea quæ factò opus sunt præsto esse, sed & ægrum, & eos qui præsentés sunt, & res externas, ad id probe comparatas esse oportet.

2. In alvi perturbationibus, & vomitionibus quæ sponte eveniunt, si qualia oportet, purgentur, conducit,
&

4 HIPPOCRATES.

φέρει τε, κ' αὖ φάρμακον φέρουσιν· ἡ
 ὅ μὴ, τὸν αὐτίον. Οὕτω ὅ κ' ἡ κα-
 τὰ φύσιν, ἡ μὲν οὐκ ἔστιν αὖτε γίνεσθαι
 γίνεσθαι, ἡ μὲν φέρει τε, κ' αὖ φάρμακον
 φέρουσιν· ἡ δὲ μὴ, τὸν αὐτίον.
 Ἐπιβλέπειν δ' αὖτε κ' χόρην, κ' αὖ-
 ρίον, κ' ἡλικίον, κ' ἡλικίον, κ' ἡλικίον
 δ' αὖτε, ἡ δ' αὖτε.

γ'. Ἐν τοῖσι γυμνασασσίν αὖ
 ἐπ' αὖτε διεξίαι σφαλεραί, ἡ
 αὖτε ἐπ' αὖτε ἡλικίον· ἡ δ' αὖτε
 αὖτε αὖτε αὖτε αὖτε, ἡ δ' αὖτε αὖτε.
 Ἐπεί δ' αὖτε αὖτε αὖτε αὖτε, ἡ δ' αὖτε
 αὖτε αὖτε αὖτε αὖτε, ἡ δ' αὖτε αὖτε.
 αὖτε αὖτε αὖτε αὖτε, ἡ δ' αὖτε αὖτε.
 αὖτε αὖτε αὖτε αὖτε, ἡ δ' αὖτε αὖτε.

SECTIO I.

5

facile tolerant ; sin minus,
contra evenit. Itidem & vaso-
rum evacuatio , si qualis debet,
facile tolerat, conducit, & facile tolerant;
sin minus, contra fit. Adhiben-
da igitur consideratio & loci, &
tempestatis anni, & ætatis, &
morborum in quibus hæc fieri
debeant, necne.

3. Benehabita athletarum
valetudo ad summum progres-
sa, ubi ad plenitudinis extre-
mum pervenerit, lubrica est,
cum non possit eodem statu
permanere, neque quiescere.
Quandoquidem vero non qui-
escit, neque jam potest in me-
lius progredi, reliquum est, ut
deterius labatur. His igitur de
causis

6 HIPP. APHOR.

λύφν ξυμφέρει μὴ βραδείας, ἵνα
 πάλιν ἀρχὴν ἀναδρέψῃς λάβῃ
 τὸ σῶμα, μηδὲ τὰς ξυμπλώσεις
 εἰς τὸ ἔχρατον ἄγῃ· σφραλερὸν γδ.
 ἀλλ' ὁκοίην ἴαν ἢ φύσις ἢ τῷ μέλ-
 λοντος ὑπουφύῃ, εἰς τὸ αὐτὸ ἄγῃ.
 ὡσαύτως δὲ καὶ αἱ κανώπεις αἱ εἰς
 τὸ ἔχρατον ἄγασθαι, σφραλεραί. καὶ
 πάλιν αἱ ἀναδρέψεις, αἱ ἐν τῷ ἔ-
 χρατὶ εἶσθαι, σφραλεραί.

δ'. Αἱ λεπτὰ καὶ ἀκρεβέες δί-
 αι, καὶ ἐν τοῖσι μακροῖσιν αἰεὶ
 πᾶσι, καὶ ἐν τοῖσιν ὀξείσιν, ἢ
 μὴ ὀπιδέχῃ, σφραλεραί. καὶ
 πάλιν αἱ εἰς τὸ ἔχρατον λεπτό-
 τητος ἀφριγμύσαι δίαι, χα-
 λειπαί. καὶ γδ αἱ πληράσεις αἱ
 εἰς

SECTIO I. 7

minus pleniorum illum corpo-
 ris habitum haud cunctanter
 olvere expedit, quo corpus al-
 terius nutritionis initium su-
 mat. Neque tamen eo deve-
 niendum, ut vasa extreme con-
 solidant; (periculosum enim:) sed
 naturalis fuerit ejus qui sustinere
 debet natura, eoque progre-
 diendum. Eadem vero ratione
 vacuationes ad extremum de-
 ductæ, periculosæ; contraque
 defectiones ad summum pro-
 gressæ, periculosæ.

4. Tenuis, & exacta victus
 ratio, cum in morbis longis sem-
 per, tum in acutis ubi non ad-
 mittitur, parum tuta est. Ac rur-
 sus victus, qui ad summam per-
 venit tenuitatem, gravis. si quidē
 ad

8 HIPPOCRATES.

ἐς τὸ ἔχειν ἀφικνῆσθαι, χαλε-
παί.

θ'. Εἰς τῆσι λεπῆσι διαίτησις
ἀμφοτέρωσιν οἱ νοσῶντες, διὰ
μᾶλλον βλάπνεται. Πᾶν γὰρ τὸ ἀ-
μάρτημα ὃ ἀν γήνηται, μέγα γί-
νεται μᾶλλον ἐν τῆσι λεπῆσι, ἢ ἐν
τῆσιν ὀλίγοις ἀδρότεροις διαίτησι.
Διὰ τῆτο καὶ τοῖσιν ὑγιαίνουσι σφα-
λεροὶ αἱ φάνησι λεπταὶ καὶ καθεστη-
κῆται καὶ ἀκρεβέες δίδονται, ὅτι τὰ
ἀμάρτημα ὀλίγα χαλεπώτερον φέ-
ρουσι. διὰ τῆτο ἐν αἱ λεπταὶ καὶ ἀ-
κρεβέες δίδονται σφαλεροὶ ἐς τὰ
πλεῖστα τῶν μικρῶν ἀδρότερον.

ς'. Εἰς δὲ τὰ ἔχοντα νοσή-
ματα αἱ ἔχοντα θεραπεῖαι ἐς ἀ-
κρεβείω καὶ πᾶσι.

ζ'. Οἷον μὲν οὖν καὶ τοῦτο τὸ
ἔστιν.

SECTIO I. 9

ad extremum perductæ plenitudines, graves sunt.

5. In tenui victus ratione delinquent ægri, ob quod magis læduntur. Quodcunque enim peccatum, in tenui quam in paulo pleniore victus ratione gravius esse solet. Idcirco etiam sanis parum tuta est tenuis, & certo præscripta, ac accurata victus ratio, quoniam errata gravius ferunt. Eam igitur ob causam tenuis, & accuratus victus paulo pleniore maxima ex parte periculosior est.

6. Ad summos morbos, summæ ad unguem curationes adhibita, optime valent.

7. Cū ergo morbus est peracutus,

10 ΗΙΡΡ. ΑΡΗΟΚ.

νέσιμα, αὐτίκα τὸν ἰχάτως πῶ-
 νας ἰχθ, κὶ τῇ ἰχάτως λεπιοτάτη
 διαίτη ἀναγκαῖον χρεῖας· ὅκx διέ-
 μι, ἀλλ' ἐνδέχεται ἀδελφείρας δι-
 αιτᾶν, ποσὸν ὑπεκταταίνην,
 ὁκόζον ἂν ἡ νῆτος μαλθακώτερον
 τ' ἰχάται.

η'. Ο'κόται δὲ ἀκμάζει τὸν νέ-
 σιμα, τότε κὶ τῇ λεπιοτάτη διαί-
 τη ἀναγκαῖον χρεῖας.

θ'. Σιωπεκμαίρεας δὲ χρεῖ
 καὶ τ' νοσέοντα, εἰ ἐξαρκέσθ τῇ
 διαίτη πῶς πῶς ἀκμῶν τ' νέσε,
 κὶ πῶς πῶς ἐκ τῆς ἀπαυδῆσθ πῶ-
 πῶς, κὶ ἐκ ἐξαρκέσθ τῇ διαίτη,
 ἢ ἡ νῆτος πῶς πῶς ἀπαυδῆσθ, κὶ
 ἀμβλυεῖ.

ι'. Ο'κόζοιτη μὲν αὐτί-
 κα

SECTION I. 11

tus, extremos protinus obtinet labores, & extremetenuissima victus ratione necessario utendum. Cum vero non est, sed pleniorē victum adhibere concessum est, tam à tenui victu se subducere oportet, quam morbus ab extremis recesserit.

8. Cum morbi summa est vehementia, tum vel tenuissimo victu uti necesse est.

9. At conjectura etiam ex agro facienda, an cum eo victu satis esse possit ad morbi vigorem usque, an non prius ille deficiat, neque cum tali victu satis esse possit, vel prior morbus deficiat, & obtundatur.

10. Quibus igitur statim
B 2 vigor

12 HIST. ARHON.

καὶ ἡ ἀκμὴ, αὐτίκα λεπτῶς δια-
ταῖ· ἐκείνοις γὰρ ἐς ὕψος ἡ ἀκμὴ,
ἐς ἐκείνη καὶ πρὸς ἐκείνη μίχρον
ἀφ' αὐρετέον. ἔμμενον δὲ πωτέ-
ρως διαταῖ, ὡς αὖ ἐξ ἀρκέσθ' ὁ γε-
σάτω.

12. Εἰν τοῖσι παροξυσμοῖσι
ὑπερέλκεται καὶ· τὸ ἀφαισθάναι
γὰρ βλάπτει· καὶ ὁκνῶσα καὶ ἀειό-
σας παροξύνει. ἐν τοῖσι παρο-
ξυσμοῖσι ὑπερέλκεται καὶ.

13. Τῆς δὲ παροξυσμοῦ καὶ
ταῖς κατὰ τὰς ἀσθενείας ἐκείναις αἰ-
σῶσι, καὶ αἰσῶσι τὸ ἐκείναις, καὶ αἰσῶσι τὸ πα-
ροξύνει· ἀλλ' ἄλλας ὁρμῶσαι, ὡς
καὶ κατὰ τὴν αἰσῶσι, ὡς καὶ τὸ παρ' ἡμέ-
ραν, ὡς καὶ τὸ διὰ πλείονος χρόνου
γίγνεται.

SECTION I. 15

vigor adest, iis protinus victus tenuis exhibendus. Quibus vero postea vigor futurus est, iis sub ipsum vigoris tempus, & paulo ante cibus subtrahendus. Antea vero uberior cibus exhibendus, quo æger satis esse possit.

11. In exacerbationibus cibum refugere oportet: exhibere enim noxium. Et quæcunque per circuitus ingravescent, in ipsis accessionibus reformidare oportet.

12. Morbi, & anni tempestates, & circuituum collata inter se vicissitudines, siue quotidie, siue altero quoque die, siue etiam per maiora intervalla fiant, accessiones, & morborum conditiones, indicabunt

14 HIPPOCRATES.

γίγνεται. ἀτὰρ καὶ πεῖσιν ὅτι φα-
νοῦσι πιν, οἷον ἐν πλερετικοῖ-
σι πύελον, καὶ αὐτίκα ὅτι φαίνε-
ται ἀρχουδία, βραχύνει. καὶ δι'
ὅσων ὅτι φαίνεται, μικρῶν. καὶ
ὅσων, καὶ ὑποκαρῆματα, καὶ ἰδρω-
τες, καὶ ὀκρετα καὶ διύσμετα,
καὶ βραχία, καὶ μακρὰ τὰ ἰσ-
χύματα, ὅτι φαίνεται ὁμοῖα δηλοῖ.

17. Γίγνεται δὲ φορώτατα νη-
στεύειν φέρει, διούτερον οἱ κα-
τασκευάσεις, ἥμισυ μειράκια, πάν-
των δὲ μάλιστα παῖδες. ταύτων
δὲ αὐτίκων ἄσθεναν εὐχὴ αὐτὰ
ἵκουσιν ὡς θυμὸς τεραῖς ἰδίται.

18. Τὰ αὐξάνοντα πλε-
ον

SECTIO I. 15

cabunt. Quinetiam & per ea, quæ mox apparent, eadem indicantur. quale quid in morbo laterali laborantibus sputum, si statim circa initia subappareat, morbum brevem; si vero posterius videatur, longum futurum denuntiat. Urinæ quoque, & alvi excrementa, & sudores, ubi apparuerint, iudicatu faciles, vel difficiles, & breves, vel longos fore morbos, indicant.

13. Senes facillime jejuniū tolerant; secundum eos, qui constantem aetatem degunt; minimum adolescentes; ex omnibus vero præcipue pueri; atque inter ipsos, qui ad actiones obeundas promptiores existunt.

14. Quæ crescunt plurimum

B 2

mun

16 HIPPOCRATES.

τον ἔμφυτον θερμόν, πλεί-
ους ἐν δέῃ τρεφῆς· εἰ δὲ μὴ, τὸ
σῶμα ἀναλίσκει. Γέρουσι δὲ ὀλί-
γον τὸ θερμόν, διὰ τὸ ἄρχειν ὀλί-
γων ὑπερκαυμάτων δέον. ὑπὸ
πολλῶν γὰρ ἀποσβέννυται. διὰ τὸ
καὶ οἱ πυρετοὶ τοῖσι γέρονσι ἔχουσιν
ὁμοίως ὀξείας· ψυχρὸν γὰρ τὸ σῶ-
μα.

ἡ. Αἱ κοιλίαι γέροντες καὶ ἡ-
ρεσθερμόταται φύσιν, καὶ ὑπνοὶ
μακρότατοι. ἀνταύτησιν ἐν τῇ-
σιν ἔρρισι καὶ τὰ προσάρματα
πλείω δοτιόν· καὶ γὰρ τὸ ἔμφυτον
θερμὸν πλείον ἔχουσιν, τρεφῆς ἐν
πλείονος δέον. σημεῖον αἱ ἡλικίαι,
καὶ οἱ ἀθληταί.

ἡ. Αἱ

SECTIO I. 17

um calorem innatum obti-
nent, plurimo igitur indigent
alimento, alioqui corpus absu-
mitur. In senibus vero cum
paucus calor insit, iccirco sane
paucis fomitibus indigent, à
multis namque extinguuntur.
Eandem etiam ob causam ne-
que senibus, quod eorum cor-
pus sit frigidum, febres perinde
acutæ contingunt.

15. Per hyemem, & ver
ventres natura calidissimi, som-
nique longissimi. Per ea igitur
tempora copiosiora cibaria ex-
hibenda, siquidem plurimus est
calor natus, ideoque copio-
siore indigent alimento. Quod
inducant ætates, & athletæ.

E 3

16. Vi-

ις'. Αἱ ὑγραὶ δίαται πα-
 πῖσι πυρεταίνεσι ξυμθέρεσι
 μάλιστ' ἀπαθείοισι, καὶ τοῖσιν ἄλ-
 λοισι τοῖσιν ἔπως εἰδισμύοισι δι-
 αιτᾶσιν.

ιζ'. Καὶ οἷσιν ἀπαξ, ἢ δις, καὶ
 πλείω, ἢ ἐλάσσων, καὶ κατὰ μέ-
 ρος. δοτέον δὲ π καὶ τῇ ὥρῃ, καὶ τῇ
 χώρῃ, καὶ τῇ ἡλικίῃ, καὶ τῇ ἔσθῃ.

ιθ'. Θέρπος καὶ φθινοπώρος σπ-
 τία δυσφοράτατα φέρεσι, χιμῶ-
 νος ῥήϊστα, ἦρος δ' ὀλίγον.

ιβ'. Τοῖσιν ἐν τῇσι παλαιόδο-
 ροι παροξυσμοῖσιν μηδὲν διδόν-
 ται, μηδ' ἀναγκάζειν, ἀλλ' ἀφαι-
 ρίειν τῶν προαδισίων πρὸ τῆς κρι-
 σίας.

ιε'. Τε

SECTIO I. 19

16. Victus ratio humida,
tam febricitantibus omnibus,
tam pueris maxime atque aliis,
qui ejusmodi victu uti consue-
verunt, confert.

17. Animadvertendi sunt
etiam quibus semel, aut bis, &
quibus copiosior, aut paucior,
aut per partes cibus offerendus
est. Aliquid autem tempori, re-
gioni, ætati, & consuetudini
concedendum.

18. Per æstatem, & autu-
mnus, cibos gravissime ferunt,
per hyemem facillime. Ver post
hyemem secundum locum ob-
servet.

19. Quibus per circuitus
accessiones contingunt, nihil
dato, neque cogito, sed de cibo-
rum accessione ante judicatio-
nes detrahito.

20. Quæ

20 ΗΙΡΡ. ΑΡΗΟΡ.

κ'. Τὰ κρινόμενα καὶ τὰ κινούμενα ἄρτίως, μὴ κινέειν, μὴ κινώμεναι, μὴτε φαρμακεύειν, μὴτε ἀλλοιοῖν ἐρεθισμοῖσιν, ἀλλ' ἔειναι.

κα'. Ἀ' δεῖ ἄλγιν, ὅκιν ἂν μάλιστα ῥίτη, ταύτην ἄλγιν, διὰ τῆς συμφρεθίντων χωρίων.

κβ'. Πίπωνα φαρμακεύειν καὶ κινέειν, μὴ ὡμα, μὴδ' ἐν ἀρχῇσιν, ὡς μὴ ὀργῇ. τὰ ὅπλα ἔπειτα ἐν ὀργῇ.

κγ'. Τὰ χωρίοντα μὴ τῷ πλήθει τεκμαίρεσθαι, ἀλλ' ὡς ἂν χωρίον οὐκ δεῖ, καὶ φέρει εὐφρόνης. καὶ ὅκιν δεῖ μέλει κειποδυμίας ἄλγιν, καὶ τῇ ποιῆειν, ὡς ἐξαρκίᾳ ὁ νόσος.

κδ'. Ε' γ

SECTIO I. 21

20. Quæ indicationem
subeunt, aut jam perfecte subie-
runt, ea neque moveto, neque
medicamentis, neque aliis irri-
mentis innovato, sed finito.

21. Quæ educere oportet,
quo maxime vergunt, eo duci-
per loca convenientia.

22. Cocta medicamento
urgante educito, ac moveto,
minime cruda, neque per initia,
si suapte impetu ad excretio-
nem ferantur, quod fere non
accidit.

23. Quæ prodeunt copia
minime astimanda, sed ut
qualia expedit, prodeant, & a-
per facile ferat. Atque ubi ad
nisi defectionem usque edu-
cere oportet, id etiam facien-
um, si ager sufficere queat.

24. In

22 HIPPOCRATES.

αδ'. Ε'ν τεῖσιν ὀξείσιν πᾶσι
σιν ὀλιγάκις, καὶ ἐν ἀρχῇσι, τῇ
φαρμακείῃσι χρίεσθαι, καὶ τὸ το
ἐξὸς κενήσασθαι πρὸς τὸν.

κε'. Η'ν οἷα διττὰ καθαιρέσθαι
καθαίρονται, συμφορὰ τε, καὶ
φόρος φέρει· τὰ δὲ ἐν αἰτίᾳ
διχρεῖς.

Τμήμα δεύτερον.

Α.

Ε'Ν τῷ νοσήματι ὑπὸς αὐ
τον ποιέει, θανάσιμον. ὡς
διὰ ἀφελείας, καὶ θανάσι
μον.

Β'. Ο'κκ παραφροσύνην ὑ
πὸς αὐτῇ, ἀγαθόν.

γ'. Ὑπὸς

SECTIO II. 23

2. In morbis acutis raro,
per initia, medicamentis pur-
gantibus utendum, idque dili-
genter ante adhibita circumspe-
ctione faciendum.

25. Cum purgantur, quæ
purgari decet, confert, & facile
tolerant; ubi contra accidit,
difficulus.

Seçtio Secunda.

I.

Quo in morbo somnus
laborem facit, lethale;
quod si juvet somnus,
minime lethale.

2. Ubi delirium somnus se-
caverit, bonum.

3. Som-

24 ΗΙΡΡ. ΑΡΗΘΡ.

γ'. Ὑπνος, ἀχρυπνία, ἐμ-
θετεται τῷ μετρίῳ μᾶλλον ὕπ-
νου, καὶ κού.

δ'. Οὐ πλησμονή, ἔ λιμοῦ
ἐνδ' ἄλλο ἐνδ' ἀγαθόν, ὅ π ὅ
μᾶλλον τ' φύσις ἡ.

ε'. Κόποι αὐτόματοι φεσζο-
σι γέταε.

ς'. Οἱ πόνοι ποιεῖν τὴν π
σώματος, τὰ πολλὰ τῶν πόνοι ἐν
ἐνδ' ἀνόν, τατίοισιν ἡ γνώμη
ποσέει.

ζ'. Τὰ ἐν πολλῇ χρόνῳ ἀν-
πλωρόμην σώματα, καὶ τῶν ἐν
τατρίφει δει· τὰ ὅ ἐν ὀλίγῳ ὀλί-
γως.

η'. Ἡ ἐν ἰσχύι περὶ τὴν
λαμβάνειν περὶ μὴ ἰσχύι, ση-
μαίνει ὅτι πλείονι περὶ τὴν
σῶμα

SECTIO II. 25

3. Somnus, vigilia, utraque modum excedentia, malum denunciant.

4. Neque satietas, neque nimis, neque aliud quippiam modum, quod supra naturam modum fuerit.

5. Lassitudines sponte oborta, morbos prænunciant.

6. Quibus pars aliqua corporis dolet, neque fere dolorem sentiunt, his mens agrotat.

7. Attenuata longo temporis intervallo corpora, lenterecere oportet, atque brevi, ceciderit.

8. Si quis ex morbo citum capiens, vires non recitat, copiosiore alimento
C cor-

26 HIPPOCRATES.

σώμα χρίεται. ὡς ὅτε προφύμ
λαμβάνοντες τὸ γίγνηται, καὶ
ἐκείνου ὅτι κενώσας δέξεται.

Β'. Τὰ σώματα χρίν, ἐκ τῶν
πρὸς ἐκείνην καθάρσιν, ὅτι ὅρα πρὸς
ἐκείνην.

Γ'. Τὰ μὴ καθαρά τῶν σωμάτων
ἐκείνου ἐκείνου ἐκείνου, μάλιστα ἐκείνου
ἐκείνου.

Δ'. Πρὸς πληρῶν ποτὶς,
ἐκείνου.

Ε'. Τὰ ἐγκυαλισμάνομιν
ἐκ τῶν ἐκείνου, μάλιστα ἐκείνου,
ἐκείνου ἐκείνου ἐκείνου.

ΣΤ'. Οἱ ἐκείνου κρίσις γίνεται
ἐκείνου ἢ ἐκείνου ἐκείνου ἢ ἐκείνου
ἐκείνου ἐκείνου ἢ ἐκείνου ἐκείνου
ἐκείνου ἐκείνου ἐκείνου.

Ζ'. Ε

SECTIO II. 17

corpus uti significat. Quod si
tribum minime capiente istud
contingat, evacuatione indi-
gere sciendum est.

9. Cum quis corpora pur-
gare velit, ea ad fluxum bene
comparata faciat oportet.

10. Impura corpora quo
plus nutrias, eo magis laedas.

11. Potu, quam cibo, refici,
proclivius est.

12. Quæ per morbos post
judicationem intus relinquin-
tur, morborum reversiones fa-
cere consueverunt.

13. Quibus judicatio con-
tingit, iis nox, accessionem præ-
cedens, gravis; quæ vero sequi-
tur, plerumque levior esse so-
let.

C 2

14. In

38 HIPPOCRATES.

15'. Εἰν τῇσι τ' κοιλίῃσι ῥύτε-
σιν αἱ μεταβολαὶ ἢ διαχωρημί-
των ὠφελέουσι, ὡς μὴ ἐς τὰ πο-
νηρὰ μεταβάλλῃ.

16'. Οὐκ ἐρύγξ νοσείη, ἢ
φῆματα ἐν τῇ σάμῃ ἐκφύεῃ.
σκέπτεσθαι καὶ τὰς ἐκκρίσεις. ὡς
25 χολώδεις ἴασιν, τὸ ζῶμα ξυ-
νοσείη. ὡς ὅμοιαι πεῖσιν ὑγιάνε-
σι γίγναι καὶ, ἀσφαλὲς τὸ σῶμα
εἶναι.

17'. Οὐκ ἀλμυρὸς, ἢ δεινὸς πο-
νῆεν.

18'. Οὐκ ἂν εὐροφὴ παρὰ φύ-
σιν πλείων ἐσέλθῃ, τὸ τοῦ σώματος ποι-
εῖν. ἀλλοτρίῃ καὶ ἡ ἴασις.

19'. Τῶν πρεφόντων ἀ-
δρῆως καὶ ταχέως, ταχέως
καὶ

SECTIO II. 29

14. In alvi fluxionibus dejectionum mutationes, nisi ad pravas commutentur, juvant.

15. Cum fauces agrotant, aut tubercula in corpore exoriuntur, excretiones in considerationem adhibendæ. Si namque biliosæ sint, corpus simul agrotat. At si sanorum similes extiterint, secure corpus nutrias.

16. Cum inedia premit, laborare minime convenit.

17. Ubi copiosior præter naturam cibus ingestus fuerit, id morbum creat.

18. Eorum quæ univ-
ersim, & celeriter alunt, celeres
quo-

30 ΗΙΡΡ. ΑΡΗΟΡ.

κὺ αἱ διαχωρήσεις γίγνοντῃ.

ιβ'. Τῶν ὀξείων νοσημάτων ἐ
σπᾶμπαν ἀσφαλείας αἱ περιδιχρ-
ροῦσιες, ἔπε τῆ θανάτου, ἔπε τῆ
ὕψινης.

κ'. Οὐκόσοισι νέοισιν ἐξῆν αἱ
καυλίαι ὕψις εἶσι, τετέοισιν δὲ
γηράσκων ξηραίνοντῃ. ὁκόσοις ἡ
νέοισιν ἐξῆν αἱ κοιλίαι ξηραί εἶσι,
τετέοις περιεφυτέροις γλυομέ-
νοισιν ὕψις εἶναι.

κα'. Λιμὴν θάλασσαν λυφ.

κβ'. Ἀπὸ πλησμονῆς ἐκόςτα
ἐν νοσήματι γένητῃ, κένωσις ἰῆ-
ται. κὺ ἐκόςτα ἀπὸ πεινῶσιος, πλη-
σμονῆς. κὺ τῆς ἄλλων ἢ ὑπεραντίω-
σις.

κγ'. Τὰ ὀξεία τῆς νοσημάτων
κρίνε.

SECTION II. 31

quoque excretiones esse fo-
lent.

16. Morborum acutorum
non in totum certæ sunt præ-
nuntiationes, neque salutis, ne-
que mortis.

20. Quibus per juventu-
rem alvi sunt humidæ, iis se-
nescentibus exiccantur: quibus
vero in juventute alvi siccæ
sunt, iis, cum senes evadunt, hu-
meantur.

21. Famem vini potio sol-
vit.

22. Morbos ex repletionem
ut curat evacuatio, sic eos, qui
ex vacuatione fiunt, repletio:
& in cæteris contrarietas, re-
medio est.

23. Morbi acuti intra dies
C 4 qua-

31 HIPPOCRATES.

κρίνει ὅτι πενταρικοαδέκας ἡμέ-
ρησι.

κδ'. Τῶν ἐπὶ τὴν τετάρτην ὁπ-
θλος. ἑτέρως ἐβδομάδος ἢ ὀγδὼς
ἀρχή. θεωρητὴν ἢ ἐνδεκάτην αὐ-
τὴ γὰρ ὅτι τετάρτη τ' ἑτέρως ἐβ-
δομάδος. θεωρητὴν ἢ πάλιν ἢ ἐπὶ α-
ραδεκάτην. αὐτὴ γὰρ ὅτι τετάρτη
μὲν ὅτι τ' πενταρικοαδέκας,
ἐβδομή ἢ ὅτι ἐνδεκάτης.

κε'. Οἱ θηριοὶ πενταταῖοι τὰ
πολλὰ γίνονται βραχέες· οἱ δὲ
φθινοπωρινοὶ μακροί, καὶ μάλιστα
οἱ πρὸς τὸν χειμῶνα συνάπτον-
τες.

κς'. Πυρετὸν ὅτι αἰσμεν
βίλητος ἡμιάς, ἢ αἰσμεν ὅτι
πυρετὴ.

κε'. Τοῖ-

SECTIO II. 33

quatuordecim iudicatione terminantur.

24. Quartus septenariorum index est : Octavus alterius septimanæ principium : Undecimus etiam spectandus dies, siquidem alterius septimanæ quartus est. Rursus quoque spectandus decimus septimus, is siquidem à decimo quarto quartus est, & ab undecimo septimus.

25. Quartanæ æstivæ fere breves existunt, autumnales vero longæ, præsertim quæ ad hyemem pertingunt.

26. Convulsioni febrem advenire præstat, quam convulsionem febri.

C 3

27. 51

κζ.. Τοῖς μὲν κτ' λόγον καφί-
 ζουσιν ἔστι πείθειν, ἔστι φοβεῖσθαι
 λίω τὰ μοχθηρὰ γινόμενα παρα-
 λόγως. τὰ γὰρ πολλὰ τῶν ποιητέων
 ὄντι ἀβέβαια, καὶ ἔστι πάντες τοὶ δια-
 μένειν ἔστι χροίζοντες εἶωθε.

κη'. Τῶν πυρεσσόντων μὲν σφα-
 τήσας ὅτι πολαίως, τὸ δια-
 μένειν καὶ μηδὲν ἐκδιδόναι τὸ σῶ-
 μα, ἢ καὶ συντήκεσθαι μάλλον τοῦ
 κτ' λόγον, μοχθηρόν. τὸ μὲν γὰρ
 μήκος ἔστι σημαίνει, τὸ δὲ ἀ-
 δένειν.

κθ'. Ἀρχομένων τῶν ἰσίων, ὡς
 πρὸς κέντρον κέντρον, κέντρον ἀκμαζουσῶν
 δὲ, ἡσυχίᾳ ἔχει, βέλπτον ὄντι.

λ'. Πι-

SECTIO II. 35

27. Si quæ non pro ratione
levant, iis non oportet fidere,
neque admodum metuere ma-
la, quæ præter rationem eve-
niunt. Ex his enim multa in-
certa esse, neque multum per-
durare, neque diutius perseve-
rare, consueverunt.

28. Corpus eorum qui
non omnino leviter febrici-
tant, in eodem consistere, &
nihil concidere, vel etiam ma-
gis, quam ratio postulat, exte-
nuari, malum. Illud siquidem
morbi diuturnitatem, hoc ve-
ro imbecillitatem significat.

29. Per morborum initia,
si quid movendum videtur,
moveto. Cum vero vigent,
quiescere præstat.

30. Cir-

36 ΗΙΡΡ. ΑΡΗΟΚ.

λ'. Περὶ τὰς ὀρχὰς καὶ τὰ τέ-
λυ, πάντα ἀδινίστρεα· καὶ δὲ
τὰς ἀαμὰς, ἰχυρῶτερα.

λα'. Τῷ ἑξ ἁρρωσίῃς ὁσιτέον-
τι μηδὲν ὀπιδιδόναι τὸ σῶμα,
μοχλῶν.

λβ'. Ὡς τὰ πολλὰ πάντα οἱ
φαύλως ἔχοντες, κατ' ὀρχὰς μὲν
εὐσιτέοντες, καὶ μηδὲν ὀπιδιδόν-
τες πρὸς τῷ τίλει πάλιν ὁσιτέα-
σιν. οἱ δὲ κατ' ὀρχὰς μὲν ὁσι-
τέοντες ἰχυρῶς, ὑστερὶν δὲ εὐσι-
τέοντες, βέλπετ' ἀπαλλάσσειν.

λγ'. Ἦν δὲ πύση νέσση τῷ
ἁρρῶντι πύω διάνοιαν, καὶ εὖ
ἔχει πρὸς τὰς πρεσφορεάς,
ἀγα.

SECTIO II. 39

30. Circa initia, & fines
omnia sunt levissima, at circa
rigores, vehementissima.

31. Si cui ex morbo cibum
probe sumentis corpus nihil
proficit, malum.

32. Ut plurimum omnes
male habentes, circa initia
quidem cibum bene sumentes,
neque quicquam proficientes,
ii tandem rursus cibum aver-
santur. At qui circa initia qui-
dem vehementer cibos fasti-
diunt, postea vero eos probe
assumunt, ii melius degunt.

33. Mente constare, & be-
ne habere ad ea quæ offeruntur,
quotis

ἀγαθόν· τὸ δὲ ἐλαττίον, κακόν.

λδ'. Εἴν τῇσι νέστοισιν ἥσυχον
κινδυνεύουσιν οἷσιν ἂν οἰκίῃ τῆς
φύσιος, καὶ τῇ ηλικίᾳ, καὶ τῆς ἐξίως,
καὶ τῆς ὥρης ἢ νέστος ἢ μάλλον, ἢ
οἷσιν ἂν μὴ οἰκίῃ κατὰ τὴν πε-
ρίεον.

λε'. Εἴν πάσῃσι τῇσι νέστοισι
τὰ πρὸς τὸν ὀμφαλὸν καὶ τὸ ἥττον
πλάτος ἔχον, εἰλπίον ὅτι· τὸ δὲ
σφόδρα λεπτόν καὶ ἐκτετικὸς, μο-
χθηρόν. ὁπισθοφαλὸς δὲ τὸ τοιαῦτον
καὶ πρὸς τὰς κάτω καθάρσιαις.

λς'. Οἱ ὑγιεινὲς ἔχον-
ται τὰ σίματα, ἐν τῇσι φαρ-
μακείῃσι καθαυρῶνται, ἐκλύ-
ονται.

SECTIO II. 39

Quovis in morbo bonum: contra vero, malum.

34. Per morbos minore
ant periculo, quorum natura,
& ætati, & habitui, & anni
tempestati morbus magis co-
gnatus fuerit, quam quibus in
eorum aliquo minime cognatus
fuerit.

35. Quovis in morbo par-
tes quæ sunt ad umbilicum, &
superiorem ventrem, crassitudinem
habere præstat: valde autem te-
nuës esse, & tabefactas, præ-
sumum. Ad inferiores autem pur-
gationes hoc etiam parum tu-
um.

3. Qui inculpata sunt cor-
poris sanitate dum per medi-
camenta purgantia repurgan-
tur.

ον, ταχέως, καὶ οἱ πονηρὴν τροφὴν
χρῶμενοι.

λζ'. Οἱ οὖν τὰ σώματα ἔχον-
τες, φαρμακείας ἐργάζονται.

λη'. Τὸ σμικρὸν χεῖρον καὶ
πόμα καὶ σιτίον, ἥδιον δὲ, τῷ
βελπόναν μὲν, ἀνδρείον δὲ, μέλ-
λον αἰρετίον.

λθ'. Οἱ πρεσβύτεροι τῷ γένει
τὰ μὲν πολλὰ νοσήσκειν ἵκασιν. ὅσα δὲ
ἐν αὐτοῖσι χρόνια νοσήματα γίνον-
ται, τὰ πολλὰ ξυναποθιήσκουσιν.

μ'. Βράγχαι καὶ κρύσαι πῖσι
σφοδρὰ πρεσβύτητι καὶ πεπαιγνο-
ταί.

μα'. Οἱ ἐμλυσόμενοι ποικίλως
καὶ ἰσχυρῶς ἀπὸ φαρμάκων
φάρμακα.

SECTIO II. 41

ur, cito exolvuntur, & qui pra-
co utuntur cibo.

37. Qui bene habito sunt
corpore, ad medicationes mo-
este habent.

38. Cibus, & potus pau-
o peior, suavior tamen, melio-
ibus quidem, sed minus gra-
s, anteponendus.

39. Ut plurimum quidem
enes juvenibus agrotant mi-
us. At qui ipsis morbi diu-
arni contingunt, eos fere ad
mortem comitari solent.

40. Raucedines, & grave-
ines in valde senibus non co-
untur.

41. Qui crebro, &
ehementer citra manife-
tam causam animo linguun-
D tur

42 ΗΙΡΡ. ΑΡΗΟΡ.
φάστος, ἱξαπίνης ταλδωσι.

μβ'. Λύφν δ'οποπληξίω ἰχ-
ρὺς μὲν ἀδωίαν, ἀδωίαν δὲ ἔ-
ρηίδιον.

μγ'. Τῶν ἀπαγχονίων καὶ
καταλυμένων, μηδέπω ὅτε θνή-
σκουσιν, ἐκ ἀναφύσεως οἶσιν ἂν ἀ-
φθέρῃ φεῖ τὸ σῶμα.

μδ'. Οἱ παχέες σφόδρα καὶ
φύσιν, ταχέως γίγνουν μάλ-
λον τῷ ἰχθύν.

με'. Τῶν ὀπληπικῶν τέσσι
νέοισιν ἀταλαγῶς αἱ μεταβολαὶ
μάλιστα ἐν ἡλικίᾳ, καὶ τῷ τόπῳ,
καὶ τῷ ἔειν ποιεῖται.

μς'. Δύο ποιοῦν ἅμα γνο-
μαῖν μὴ κατὰ τὸ αὐτὸν τόπον, ὅ-
σοι-

PHOL.
S E C T I O II. 43

atur, repente moriuntur.

42. Valida quidem apople-
xia nullo modo sanatur, levis
vero non facile.

43. Ex strangulatis, & disso-
lutis, nec dum mortuis, ii mini-
me ad vitam redeunt, quibus
spuma circa os collecta fuerit.

44. Natura admodum cras-
si, celerius intereunt, quam gra-
ciles.

45. Ex comitialibus, juve-
nes mutatione potissimum æ-
tatis, & regionum, & victuum,
liberationem accipiunt.

46. Cum duo dolores si-
mul minime eundem lo-
cum occupant, vehementer
D 2 ter

44 ΗΙΡΡ. ΑΡΗΟΡ.

σφιδρίπεος ἀμωροῖ τὸν ἔπερον.

μζ'. Περὶ τὰς γλυκίας τῆς
αὐτῆς, οἱ πόνοι καὶ οἱ πυρετοὶ συμ-
βαίνουσι μᾶλλον, ἢ γλομέται.

μκ'. Εἴν πάση κινήσει τῆς βό-
μης, ὁκότιν ἀσχητὴ πονάειν,
τὸ διαλαπαύει διθὺς ἀκαπον.

μθ'. Οἱ εἰσισμένοι τὸς συν-
ήθας πόνας φέρειν καὶ ὡς αὐτῶ-
νέις ἢ γέροντες, τῆς ἀσυνήθων, ἰχυ-
ροῖ τε καὶ νέων, ῥᾶον φέρουσι.

ν'. Τὰ ἐκ πολλῶν χρόνων συνή-
θων, καὶ ἢ χέρω, τῆς ἀσυνή-
θων, ὅσον ἐνοχλεῖν εἴωθε. Διὲς ἔν
καὶ εἰς τὰ ἀσυνήθων ματαβάλλειν, καὶ

ια'. Τὸ καὶ πολὺ καὶ ἐξαπίνης
καὶ ἔν

ter alterum obscurat.

47. Dolores, & febres contingunt magis circa puris generationem, quam eo confecto.

48. Quovis in corporis motu simul ac laborare cæperit, quies confestim lassitudinis est remedium.

49. Qui solitos labores ferre consueverunt, etiamsi invalidi sunt, aut senes, eos facilius ferunt, quam qui non assueti, quamvis robusti, & juvenes.

50. Quæ ex longo temporis intervallo assueta sunt, quamvis deteriora, insuetis minus molesta esse solent. Quare ad insolita etiam facienda mutatio.

51. Confestim, & repente

D 3

vacua-

46 HISP. APHOR.

κενὲν, ἢ πληρὲν, ἢ θερμαίνῃν, ἢ
ψύχῃν, ἢ ἄλλως ὁκωσῇν τὸ σῶμα
κινεῖν, σφραλερὸν. καὶ γὰρ πᾶν τὸ πο-
λὺ τῇ φύσει πολέμιον. τὸ δὲ κατ'
ὀλίγον, ἀσφαλές, καὶ ἄλλως ὡς
καὶ τις ἐξ ἐτέρου ἐφ' ἑτέρου μετα-
βαίνει.

16'. Πάντα κατὰ λόγον ποι-
εῖν τι, καὶ μὴ γηρομένων τῶν κατὰ λό-
γον. μὴ μεταβαίνειν ἐφ' ἑτέρου, μέ-
νοντος τῷ δόξαντος ἐξ ἀρχῆς.

17'. Οἱ κόποι τὰς κοιλίας ὑ-
χεῖς ἔχουσι, νέοι μὲν ὄντες, βέλ-
τιον ἀπαλλάσσουσι τὰς ξηρὰς ἐ-
χόντων. ἐς δὲ τὸ γῆρας, χεῖρον ἀ-
παλλάσσουσι. ξηραίνουσι γὰρ ὡς ὅτι
τὸ

SECTIO II. 47

vacuare, vel implere, vel cale-
facere, vel refrigerare, vel ut-
runque aliter corpus movere,
periculosum: omne siquidem
natura inimicum.
Verum quod paulatim fit, se-
curum est, tum vel maxime, si
quis ab uno ad alterum trans-
ierit.

52. Cum quis omnia recta
ratione facit, neque tamen pro
ratione succedit, non est ad
aliud progrediendum, si manet
quod ab initio visum est.

53. Quicunque alvos ha-
bent humidas, ii quidem, si
juvenes sunt, melius degunt,
quam qui siccas habent. At in
senectute pejus degunt, cū ipsis
D 4 sene-

τὸ πολὺ τοῖσι λυσιμενέσκει.

υδ'. Μεγίστη δὲ σώματος ἐν-
ταύται μὲν, ἰλδοθίρειαν κ', ἐκ ἀει-
δίας. ἰγνηράσαι δὲ, δύχρυσον, κ'
χεῖρον τῷ ἐλασσύνων.

Τμήμα τρίτον.

Α'.

Α Γ' μεταβολὰν οὖν ὀρίων
μάλιστα τίκτουσι ισοήμα-
τα. καὶ ἐν ταῖσι ὥρησιν
αἱ μεγάλα μεταλλαγαὶ ἢ
ψύξιος, ἢ θάλψιος, καὶ γ' ἄλλα
καὶ λόγον ἔπωσ.

Β'. Τῶν φυτῶν αἱ μὲν πρὸς θε-
ρος, αἱ δὲ πρὸς χιμῶα β' ἢ κρη-
κῶς πεφύκεται.

γ'. Τδ'

SECTIO III. 49

senescentibus fere resiccentur.

54. Longa corporis statura
in juventute quidem degenda
liberalis, nec indecora, in sene-
scute vero inutilis, & brevitatem
deterior.

Seçtio Tertia.

I.

TEMPESTATUM an-
ni mutationes potissi-
mum morbos pariunt,
& in ipsis anni tempesta-
tibus magnæ mutationes frigo-
ris, & caloris, aliaque pro ratio-
ne ad hunc modum.

2. Naturæ hæ quidem ad æ-
statem, aliæ vero ad hyemem
bene, vel male habere consue-
vêre.

D 5 3. Mor-

γ'. Τῶν νέων ἄλλαι πρὸς
ἄλλας οὐκ ἢ κακῶς πεφύκασιν· καὶ
ἡλικία τινες πρὸς ὥρας, καὶ χώρας,
καὶ διαίτας.

δ'. Ἐν τῇ τῆς ὥρης, ὅταν τῇ
αὐτῆς ἡμέρῃς, ὅτε μὲν θάλλος, ὅτε
δὲ ψύχος γίγνηται, φθινοπωρινὰ
πανσήματα προσδέχεται χεῖρ.

ε'. Νότοι βαρυήκοι, ἀχλυώ-
δεις, καρδιακοί, νοστικοί, δια-
λυτικοί, ὁκόται ἔτι διασειῇ,
τοιαῦτα ἐν τῇ τῆς ἀρρώστιας πύ-
κτω· καὶ δὲ κόρειον ἦ, ἐκχέει,
φάρυγγες, κοιλία σκληραῖ,
δυσουρία, φρεκάδες, ὁδύ-
ναι πλυσέων, σπινθίων. ὁκόται
ἔτι

SECTIO II. 51

3. Morbi alii ad alias anni tempestates bene, vel male habere consuevere, & aetates quædam ad anni tempestates, & loca, & victus rationes.

4. Per anni tempestates, quando eodem die modo calor, modo frigus fit, autumnales morbos expectare conuenit.

5. Austri auditionis hebetudinem, & visionis caliginem inducunt, & capitis gravitatem, corpus torpidum, & languidum reddunt, cum sic inva-
uerint, ista in morbis patiuntur. Sin Aquilonia tempestas fuerit, tussis movetur, fauces exasperat, alvos indurat, urinam suppressit, horrores excitat, laterum, & pectoris dolores. Cum sic inva-
luerit,

52 HIPPOCRATES.

ἔπος διωκτέον, τοιαύτα ἐν τῇ
ἀρρώσει καὶ ἀποστέλλεται.

ζ'. Οὐκ ὅτι θύρεξ γίνεται
ἐν ὁμοίῳ, ἰσχυρὸν ἐν τοῖσι πυρ-
ρῇσι πολλὰ ἀποστέλλεται.

ζ'. Εἰς τοῖσιν αὐχμοῖσι πυ-
ρρῇσι ὅξεις γίνονται. καὶ ὡς μὲν ὅτι
πλέον ἢ τὸ ἔπος τοιαύτα ἐστίν, ὅτι
ὡς πλεονάζουσιν ἐποίνουσι, ὡς
ὅτι ποτὶς καὶ τὰ νεκρὰ πει-
σάται δὲ ἀποστέλλεται.

η'. Εἰς τοῖσι νεκρῶσι κα-
ρδίῃσι, ὡς ὡραίας τὰ ὡραία ἀπο-
στέλλονται, ὡς ὡραίας καὶ ὡραίας
καὶ ὡραίας γίνονται. ἐν δὲ τοῖσι ἀκα-
ταστάτοις ἀκαταστάτοις καὶ δὲ τ-
καταστάτοις.

θ'. Εἰς

SECTIO II. 53

erit, ejusmodi in morbis expectanda sunt.

6. Cum æstas veri similis erit, in febribus copiosos sudores expectare oportet.

7. Per squalores febres acutæ fiunt, & si quidem annus magna ex parte talis extiterit, qualem temporis conditionem, effecerit, tales fere quoque morbos expectare oportet.

8. Temporibus bene, & ordine constitutis, & tempestatem tempestitatem servantibus, morbi, qui facile consistunt, & solvantur, fiunt. In male vero constitutis, qui neque facile consistunt, neque facile solvantur.

9. Per

θ'. Εἰν φθινοπώρῃ οξύταται
αἱ νύκτοι, καὶ θανατωδέσταται τὸ
θεῖπαι. ἢ ᾧ ὑγραιότατον, καὶ ἡκί-
στα θανατωδές.

ι'. Τὸ φθινόπωρον τοῖς φθίνε-
σι κακόν.

κα'. Περὶ δὲ τῶν ὥρων, ὡς
καὶ ὁ χειμῶν αὐχμηρὸς καὶ βόρειος
ζέων, τὸ δ' ἴαφ' ἐπομβρὸν καὶ νό-
τιον, ἀνάγκη τῷ θέρει πυρετὰς
οξείας, καὶ ὀφθαλμίας, καὶ δυσεν-
τερίας γίνεσθαι, μάλιστα δ' τῇσι
γυναιξί, καὶ ἀνδράσι τοῖσι ὑγροῖ-
σι τὰς φύπας.

ιβ'. Ἦν δὲ νότιος ὁ χειμῶν,
καὶ ἐπομβρὸς, καὶ ὅστις γέ-
νηται, τὸ δὲ ἴαφ' αὐχμηρὸν καὶ
βόρειον, αἱ μὲν γυναῖκες ἴσθιν
εἰ τότε,

SECTIO III. 55

9. Per autumnum omnino morbi acutissimi, & maxime exitiales. Ver autem saluberrimum, & minime exitiale.

10. Autumnus tabidis malus.

11. Quod autem ad anni tempestates attinet, siquidem hyems plus æquo sicca, & aquilonia fuerit, ver autem valde pluvium, & austrinum, febres acutas, & lippitudines, & intestinorum difficultates ad æstatem oriri necesse est, præcipue vero in mulieribus, & viris natura humidioribus.

12. At si hyems austrina, & valde pluvia, & placida fuerit, ver autem plus justo siccum, & aquilonium, mulieres quidem quibus partus

56 HIPPOCRATES. ARTHOR.

οἱ τόκοι πρὸς τὸ ἦρ, ἐκ πάσης
προφάσιος ἐκτιτράσκουσιν. αἱ δὲ
ἂν τέκωσιν, ἀκρατέα καὶ νοσή-
δεα τὰ παθῶσι τέκνους, ὥστε ἢ
παρυτρίκα ὑπόλυαθ, ἢ λιπῶν καὶ
πρὸς τὰ ζῶν ἰόντα. τοῖσι δὲ ἄλλοι-
σι βροτοῖσι δυσανταμίαι, καὶ ὁ-
φθαλμίας ξηρὰ γίνονται. τοῖσι δὲ
πρὸς ὑτέρῃσι κατάρροι σιωτό-
μως ὑπολυσώσις.

17. Ἡ δὲ τὸ θέρους αὐχ-
μηρὸν καὶ βόρειον γλῶσση, τὸ δὲ
φθινόπωρον ἐπομβρὸν, καὶ νότιον,
καταλαλγίαι ἐς τὴν χιμῶνα γίνον-
ται, καὶ βῆχες, καὶ βράγχαι, καὶ
κόρυζαι, ἐνίοισι δὲ καὶ φθίσεις.

18. Ἡ δὲ βόρειον καὶ αὐτοῦ,
πίσι

SECTIO III. 57

tus ad verimminet, ex quavis causa abortiunt. Quæ vero pepererint, imbecillos, & morbosos infantes edunt, ita ut vel statim intereant, vel tenuēs, & valetudinarii vivant. Cateris autem mortalibus difficultates intestinorum, & lippitudines aridæ oriuntur, senioribus vero defluxiones brevi interficientes.

13. Si vero æstas plus æquo ficca, & aquilonia, autumnus vero admodum pluvius, & austrinus fuerit, capitis dolores ad hyemem oriuntur, & tussēs, & raucitates, & gravedines, nonnullis etiam & tabes.

14. Si vero aquilonius sit, & sine
E pluvius,

τοῖσι μὲν ὑγροῖσιν ἐῖς τὰς φύσεις
 καὶ τῇσι γυναιξὶ ξύμφορον· τοῖσι
 δ' ἑ λοιποῖσιν ὀφθαλμῶν ἔσονται
 ξηροὶ, καὶ πυρετοὶ ὀξέες, καὶ κόρυ-
 ζα χρόναι, αἰσίοι δὲ καὶ μαλαγ-
 χολίαι.

11°. Τῶν δὲ καταστατίων, τὰ
 αὐτῶν, τὸ μὲν ὅλον οἱ αὐχομοὶ
 ἔπομψιν εἶναι ὑγεινότεροι,
 καὶ ἥσων διατετώδες.

12°. Νοσήματα δὲ ἐν μὲν τῇ-
 σιν ἐπομψίνουσιν ὡς τὰ πολλὰ γί-
 νησι πυρετοὶ τε μακροὶ, καὶ κοι-
 λῆς ῥύσεις, καὶ σηπεδόνες, καὶ ὀπ-
 ληπτοὶ, καὶ ἀσπληνικαί, καὶ κυνάγ-
 χαι. ἐν δὲ τοῖσιν αὐχομοῖσι, φθι-
 νόωδες, ὀφθαλμῶν, ἀρθρίτιδες,
 σπληνίτιδες, καὶ δυσεντερίαι.

13°. Αἱ

SECTIO III. 59

pluviis, iis quidem, qui natura sunt humidior, & mulieribus commodus, reliquis autem lippitudines erunt siccae, & febres acutae, & diuturnae, nonnullis vero etiam melancholiae.

15. Ex anni autem conditionibus, in totum magnae siccitates assiduis imbribus sunt salubriores, minusque lethales.

16. Per assiduos imbres morbi magna ex parte oriuntur, cum febres longae, tum alvi fluxiones, putredines, comitiales, apoplexiae, & anginae. Per magnas autem siccitates tabitudines, lippitudines, articulorum dolores, urinae stillicidia, & intestinorum difficultates.

E 2

17. At

εζ'. Αἱ δὲ καθ' ἡμέρην κα-
ταστάσεις, αἱ μὲν βόρειοι τὰ πε-
σώματα ζωοῦσι, καὶ ὅτινα, καὶ
δυσκίνητα, καὶ εὐχρεα, καὶ εὐηκαύ-
τερα ποιεῖσι, καὶ τὰς κοιλίας ξη-
ραίνουσι, καὶ τὰ ὄνυμα δάκνυσι,
καὶ περὶ τὸ θάρκεα ἄλγημα, ὡς τι
προϋπάρχει, μάλλον ποιεῖσιν. αἱ δὲ
νότιοι διαλύουσι τὰ σώματα καὶ
ὕγραίνουσι, καὶ βαρυκοΐας, καὶ κα-
ρδιαρίας ποιεῖσιν, καὶ ἰλίγγες ἐν
τοῖσιν ὀφθαλμοῖσι, καὶ τοῖσι σώ-
μασι δυσκίνητον, καὶ τὰς κοι-
λίας ὕγραίνουσι.

ιβ'. Κατὰ δὲ τὰς ὥρας, τῷ μὲν
ἡμέρῃ καὶ ἄκρῃ τῷ θέρει, οἱ παῖδες,
καὶ οἱ τυτίων ἰχθύες τῇσιν ἡλι-
κῇσιν, ἀριστά τι διάγουσι,
καὶ ὑγιαίνει μάλιστα, τοῦ δὲ
θέρους

SECTIO III. 61

17. At status temporum quotidiani, aquilonii quidem corpora densant, valentiora, expeditiora, bene colorata, & melius audientia reddunt, alvos exsiccant, oculos mordent, & si thoracem dolor aliquis prius habuerit, eum magis irritant. Austrini autem corpora exolvunt, & humectant, gravem auditum, & capitis gravitatem, & vertigines afferunt, oculis, & corporibus difficilem motionem inducunt, & alvos humectant.

18. Quod autem ad anni tempora attinet, vere quidem, & prima æstate pueri, & his ætate proximi optime degunt, & maxime valent, æstate
E 3 vero,

62 HIPPOCRATES.

θέρους καὶ τῆ φθινοπόρου μέχρι
ρῶν πινος οἱ γέροντες. τὸ δὲ λοι-
πὸν τῆ φθινοπόρου καὶ τῆ χειμῶνος,
οἱ μῖσσοι τῆσιν ἡλικίῃσι.

ιδ'. Νοσήματα δὲ πάντα ἐν
παύσει τῆσιν ὥρῃσι γίνεσθαι, μάλ-
λον δ' ἐνια κατ' ἐνίας αὐτίων καὶ
γίνεσθαι καὶ παροξύνεσθαι.

κ'. Τοῦ μὲν γὰρ ἔργου τὰ μηχαν-
ικὰ, καὶ τὰ μαλακτικὰ, καὶ τὰ
ὀπληπτικὰ, καὶ αἵματος ῥύσεις,
καὶ κυψάλλαι, καὶ πόρυσαι, καὶ βράν-
χοι, καὶ βῆχες, καὶ λέπραι, καὶ
λειχῶνες, καὶ ἄλφοι, καὶ ἐξαρθή-
σεις ἐλκιδέας πλείους, καὶ φύμα-
τα, καὶ ἀρθριπκὰ.

κα'. Τοῦ δὲ θέρους ἐνία
τα τετέων, καὶ πυρετοὶ ξυνο-
χίαι, καὶ καύσοι, καὶ τριταῖοι
πλεί-

SECTIO III. 63

vero, & quadantenus autumnosenes. Reliqua autumnis, & hyemis parte, qui inter has aetates sunt medii.

19. In quibusvis anni temporibus omnis generis morbi oriuntur, nonnulli tamen in quibusdam tum fiunt, tum excitantur.

20. Vere quidem insania, melancholiae, comitiales, sanguinis profusiones, anginae, gravedines, raucitates, tussis, lepra, impetigines, vitiligines, & pustulae ulcerosae plurimae, & tubercula, & articulorum dolores.

21. Aestate autem horum nonnulli, & febres assiduae, & ardentes, & tertianae
E 4 plu-

64 ΗΙΡΡ. ΑΡΗΟΡ.

πλείστοι, καὶ τεταρταῖοι, καὶ ἑμμε-
τοι, καὶ διάρρροια, καὶ ὀρθαλμίας,
καὶ ὥτων πόνοι, καὶ συμμάτων ἐλ-
κώσεις, καὶ σκηπεδόνες ἀγνοίῳ, καὶ
ἰδρώα.

κβ'. Τῷ δὲ φθινοπώρῃ, καὶ
τῷ θέρει τὰ πολλὰ, καὶ πυρε-
τοὶ τεταρταῖοι, καὶ πλάγιοι, καὶ
σπληνίτις, καὶ ὑδρωπικὴ, καὶ φθίσεις,
καὶ τραχηλίας, καὶ λειωπείαι, καὶ
δυσεντερίαι καὶ ἰσχάδες, καὶ κωμάγ-
χαι, καὶ ἄσθματα, καὶ εἰλιοὶ, καὶ
ὀπληψίαι, καὶ τὰ μανικά, καὶ τὰ
μελαγχολικά.

κγ'. Τῷ ὅχμῳτος πλῆθει πτε-
ρεῖαι, ἀσθμασμοί, ἀσθμασμοί, κόρυζαι,
βρογχίτις, βήχες, πόνοι σιδήριον, καὶ
πλευρίτις, καὶ ὀσφύς, καὶ κεφαλαλ-
γία

SECTIO III. 65

plurimæ, & quartanæ, vomitiones, alvi profluvia, lippitudines, aurium dolores, oris exulcerationes, genitalium putredines, & sudamina.

22. Autumno vero etiam æstivi multi, & quartanæ febres, atque erraticæ, lienes, aquæ inter cutem, tabes, urinæ stillicidia, intestinorum laxitates, & difficultates, coxendicum dolores, anginæ, crebri anhelitus, volvuli, comitiales, insanix, & melancholix.

23. Hyeme vero morbi laterales, pulmonum inflammationes, lethargi, gravedines, rancitates, tusses, dolores pectorum, laterum, & lumborum, capitis dolores,

E s ver -

γίαι, ἑλιγδοί, ὑποπληξίαι.

κδ'. Ἐν δὲ τῇσιν ἡλικίῃσι πε-
 ῖθε συμβαίνει· τοῖσι μὲν σμιο-
 κροῖσι καὶ νεογνοῖσι παιδίοισιν
 ἄφθαι, ἔμετοι, ἐκχέαι, ἀγρυπνίαι,
 φόβοι, ὀμφαλὲ φλεγμαί, ὧτων
 ὑγρότητες.

κε'. Πρὸς δὲ τὸ ὀδοιτοφυεῖν
 προσάγουσιν ἔλων ὀδαξισμοί,
 πυρετοί, σπασμοί, διάρροιαί, καὶ
 μέλιστα ὅταν ἀνάγῃσι τοῦ κυβ-
 εδόντας, καὶ τοῖσι παχυτάτοις τῶν
 παιδίων, καὶ τοῖσι σκληροῖς τὰς
 κοιλίας ἔχουσι.

κε'. Πρὸς τὴν ἰσχυρίαν δὲ γρυ-
 μῶροισι παρίστανται, σπονδυ-
 λαὶ δὲ κατὰ τὸ ἰνίον εἰσὼ ὥσπερ,
 ἄσθμα.

SECTIO III. 67

vertigines, & apoplexiæ.

24. Per ætates hæc eveniunt parvis, & recens natis pueris, serpentia oris ulcera, aphthæ dictæ, vomitiones, tussēs, vigilia, pavores, circaumbilicum inflammationes, aurium humiditates.

25. Ad dentitionem vero progressis, gingivarum stimulantès prurigines, febres, convulsiones, alvi profluvia, idque præcipue cum caninos dentes emittere cœperint, & iis, qui maxime crassi sunt, & alvos duras habent.

26. At iis paulum ætate progressis, tonsillarum inflammationem, vertebræ quæ ad occipitium est interiorem in partem impulsiones, crebræ anhe-

68 HIPPOCRATES.

ἀσθμα, λιθιάσις, ἑλμινθες
 εὐγύλαι, ἀσκαρίδες, ἀκροχρ-
 δόνες, σατυριασμοὶ, χολαΐδες, καὶ
 τὰ ἄλλα φύματα, μάλιστα δὲ τὰ
 περὶ φρενὸς.

κ'. Τοῖσι δὲ ἐν πνεύματι,
 καὶ πρὸς τὴν ἡλικίαν περὶ ἄγχι,
 τητέων τε τὰ πολλὰ, καὶ πυρετοὶ
 χρόνιοι μάλλον, καὶ ἐν ῥιπῶν αἵμα-
 τος ῥύπες.

κη'. Τὰ δὲ πλεῖστα τοῖσι πνευ-
 οῖσι πάθος κέρνει, τὰ μὲν ἐν πνευ-
 μάτι, τὰ δὲ ἐν ἡλικίᾳ, τὰ δὲ ἐν
 ῥιπῶν αἵματι, τὰ δὲ ἐν
 πνεύματι καὶ ἡλικίᾳ περὶ ἄγχι. ἴσα
 δ' ἂν διαμείνη τοῖσι πνευ-
 οῖσι, καὶ τὸ ἀνάσκειν,
 ἢ τῇ-

SECTIO III. 69

anhelatione, calculi, lumbrici
rotundi, alii tenues, & minuti,
in recto intestino orti ascari-
des dicti, verrucæ Græcis ἀν-
χρόδες dictæ, satyriasini, stru-
mæ, & alia tubercula, præcipue
vero prædicta.

27. Adhuc autem ætate
provehentioribus, & ad puberta-
tem progressis, ex iis multa, &
febres diuturnæ magis, & san-
guinis ex naribus profluvia.

28. At magna ex parte pue-
ris morbi judicatione solvun-
tur, partim quidem intra qua-
draginta dies, partim vero in-
tra septem menses, nonnullis
intra annos septem, quidam et-
iam ad pubertatem progressis.
Qui vero pueris perseverarint,
neque circa pubertatem so-
luti

70 HIPPOCRATES.

ἢ τῇσι θύλεσι πρὸς τὰς τῆς κα-
ταμύων ῥήξιας, χροτίζειν εἰω-
θεῖ.

κθ'. Τοῖσι δὲ νεκρῶσι καὶ αἵ-
ματος πύπες, φθίσεις, πυρετοὶ
ὀξείας, ὑπὸ πύπας καὶ τ' ἄλλα κα-
σάντα, μάλιστα ὅτε καὶ περιεμ-
νῆα.

λ. Τοῖσι δὲ ἐν τῇ πύπῃ ἡλι-
κίῳ καὶ τῇ αἵματι, πλῆ-
ρείδες, περιπνευμονία, λήθαρ-
γοι, φρενίπδες, καύσοι, διάρροια
χρόνια, χολέρα, δυσεντερία,
λεῖψαί τε, αἱμορροΐδες.

λα'. Τοῖσι ὅτε καὶ ἐν τῇ πύπῃ
κατάρροι βήχες, σπληνίτις,
δυσκρία, ἄρθρων
πόννοι, νεφρίτις, ἱλιτίς, ἀπο-
πλη-

uti fuerint, aut foeminis circa
mensium eruptionem, diu per-
everare consueverunt.

29. Adolescentibus autem
sanguinis spuitiones, tabes, fe-
bres acutæ, comitiales, aliique
morbi, præcipue tamen prædi-
cti.

30. His vero qui hanc æta-
tem superarunt, crebri anhel-
itus, morbi laterales, pulmonum
inflammationes, lethargi, phre-
nitides, febres ardentes, diu-
turna alvi profluvia, cholera,
intestinorum difficultates, &
clavitates, sanguinis per ora ve-
narum, quæ in ano sunt, profu-
sio, *αἱμορροΐς* &c Græcis dicta.

31. At senibus spirandi diffi-
cultates, destillationes tussim
interferentes, straguriæ, urinæ dif-
ficultates, articulorum, & re-
num dolores, vertigines, apo-
plexiæ,

πλοξίη, καχεξία, ξυσμοὶ τ' σώ-
ματες ὅλῃ, ἀχρυπνία, κοιμήσις καὶ
ὀφθαλμῶν καὶ ῥινοῦ ὑγρότητες,
ἀμβλυωπία, γλαυκώσις, βαρυ-
καΐη.

Τμήμα τέταρτον.

Α'.

ΤΑς κύσας φαρμακείας
ἐν ὀργῇ, τετραλίνα καὶ
ἀχειρίπια μινών· ἔσονται δὲ
ταύται. τὰ δὲ νήπια καὶ ὀρεσβύ-
πρα ἐνλαβέσθαι χρὴ.

Β'. Εἰς αὐτὴν φαρμα-
κείαν ποιᾶντα ἀχρὶ ἐν τῷ
σώματι, ὁκοῖα καὶ αὐτόμα-
τα

PHOT
SECTIO IV. 73

plexia, mali corporis habitus,
totius corporis pruritus, vigi-
lia, alvi, oculorum, & aurium
humiditates, visus hebetudi-
nes, glaucescences, auditus gra-
ves.

Sectio Quarta.

I.

VTERUM gerentibus
medicamenta purgantia
sunt exhibenda, si hu-
mor impetu fertur ad excretio-
nem, quarto mense, & ad
septimum usque, his tamen
minus. In minoribus autem, &
grandioribus foetibus subrimi-
de se gerere oportet.

2. In medicamentorum pur-
gantium usu, qualia etiam spo-

F

te

74 ΗΙΡΡ. ΑΡΗΟΡ.

τα ἰόντα χήσιμα· τὰ δὲ ἐναν-
τίας ἰόντα, παύειν.

γ'. Ἡ'ν μὲν οἷα δεῖ καθαίρε-
σθαι, καθαίροντο, συμφορὰ τε καὶ
διφόρος φέρει· τὰ δὲ ἐναντία,
δυσχερῆς.

δ'. Φαρμακεύειν μὲν θέρους
μᾶλλον τὰς αἰῶν· χμῶνος δὲ τὰς
κάτω.

ε'. Ὑπὸ κνώα καὶ πρὸς κνὸς,
ἐργώδεις αἱ φαρμακείαι.

ς'. Τὰς ἰχθύνες καὶ θύμιας αἰῶν
φαρμακεύειν, ὑπερτελλομένους χ-
μῶνα.

ζ'. Τὰς δὲ δυσηκίας, καὶ μέ-
σος εὐσάρκας κάτω, ὑπερτελλο-
μένους θέρους.

η'. Τὰς

SECTIO IV. 79

te prodeuntia utilia sunt, talia
è corpore educere convenit,
quæ vero contrario modo pro-
deunt, cohibere.

3. Si quæ purgari decet,
purgentur, confert, & leviter
ferunt, contra vero, graviter.

4. Æstate quidem superiores
ventres potius medicamentis
repurgato, hyeme vero inferio-
res.

5. Sub canis ortum, & ante
canis ortum, molestæ sunt per
medicamenta purgationes.

6. Graciles, & facili vomiti-
one utentes, medicamento
per superiora purgare oportet,
reformidantes hyemem.

7. At difficili vomitione
utentes, & modice carnosos, per
inferiora, æstatem reformidan-
tes.

η'. Τὰς δὲ φθινώδεις, ὑπο-
σελλομένους τὰς αἰσ φαρμακείας.

θ'. Τὰς δὲ μελαγχολικὰς ἀ-
σθενέστερας τὰς κάτω, τῇ αὐτῇ
λογισμῷ τὰν αἰτίαν προσιδεῖς.

ι'. Φαρμακεύειν ἐν τοῖσι λίγῃ
οἷσιν, ὡς ὄργᾳ, αὐθιμμερόν.
χρονίζει γὰρ ἐν τοῖσι τοιούτοις κα-
κόν.

ια'. Οὐδέποτε στρόφοι καὶ πάλ-
στιν ὀμφαλὸν πόνος, καὶ ὀσφύς
ἀλγος μὴ λυόμενον, μήτε ὑπὸ
φαρμακείης, μήτ' ἄλλως, εἰς ὑ-
δρωπαξήσθην ἰδρύνει.

ιβ'. Οὐδέποτε κοιλία λεισ-
τερῶς.

SECTIO IV. 77

8. Tabescentes vero, reformatantes per superiora purgationes.

9. Atra bile abundantes largius per inferiora, simili ratione adhibita contraria purgandi via.

10. In valde acutis si suo impetu ad excretionem humor feratur, medicamento purgante eodem die utendum; siquidem in his cunctari malum.

11. Quibus intestina contorquentur, circa umbilicum labores, & lumborum dolor adest, qui neque medicamento purgante, neque alia ratione solvitur, in sicum hydropem confirmatur.

12. Quibus alvi intestinorum laxitate infestantur,

78 ΗΙΡΡ. ΑΡΗΟΚ.

περιώδεις, χυμῶνος φαρμακὸς εἶναι
ἄνω κακίαν.

ιγ'. Πρὸς τοῦ ἐλεβόρου τοῖ-
σι μὴ ῥηϊδίως ἄνω καθαυρομένοι-
σι, πρὸς τὸ πᾶσι τοῖς ἀποϋγκνίσιν
τὰ σώματα πλείονι τρυφή καὶ ἀνα-
παύσει.

εδ'. Ἐπὶ τῇ περὶ ἐλεβόρου,
πρὸς μὲν τὰς κινήσεις τῆς σωμα-
τικῆς μάλλον ἄλγος, πρὸς δὲ τοῦ
ὑπνός καὶ μὴ κινήσεως ἥσυχος. δηλοῖ
δὲ καὶ ἡ ναυπηγία ὅτι κινήσεις τὰ
ζώματα ταράσσει.

ιθ'. Ἐπὶ τῇ βέλῃ μάλλον ἄ-
λγος τὸ ἐλεβόρου, κίνησις τὸ σῶμα.
ἐπὶ δὲ πᾶσι, ὑπνον ποιεῖ καὶ
μὴ κίνησις.

ις'. Ἐλεβόρος ὅταν κίνδυνος
ᾖ τὰς σάρκας ὑγείας ἐχέει·
σπασμὸν γὰρ ἐμποιεῖ.

ιζ'. Ἀπὸ

SECTIO IV. 79

eos hyberno tempore per superiora medicamento purgare, malum.

13. Qui veratro sumpto non facile per superiora purgantur, iis ante potionem corpora copiosiore cibo, & quiete prahumectato.

14. Ubi quis veratrum portione sumpserit, corporum quidem motiones magis quam somnum, & quietem inducito. Nam vel navigatio turbari motione corpora indicat.

15. Ubi veratrum magis ducere voles, corpus moveto, ubi vero sistere, somnum conciliato, neque moveto.

16. Veratrum iis, qui sano sunt corpore periculosum, convulsionem enim inducit.

E 4

17. Si

80 HIPPOCRATES.

εξ'. Α'πυρέτως εὐνῇ, ὑποσ-
τήν, καὶ χειρὶ καὶ ποδὶ, καὶ σκοτό-
δινος, καὶ εὖμα ἐμπικρὲς μύρον, ἅπαν
φαρμακείης δ' ἐστὶν σημαίνε.

εζ'. Τὰ ἐνθάδε γὰρ φρονέον ὁδὸν ἡ-
ματι, ὁκόστω χειρὶ καὶ ποδὶ δ' ἐστὶν
ἅπαν φαρμακείης δ' ἐστὶν σημαίνε
ὁκόστω καὶ ποδὶ, καὶ ποδὶ.

εθ'. Ο'κόστω ἐν τῇ φαρμα-
κείᾳ καὶ δὴ καὶ καὶ ποδὶ καὶ ποδὶ
μύρον, ἐν τῇ καὶ ποδὶ καὶ ποδὶ
καὶ ποδὶ.

εδ'. Α'πυρέτως εὐνῇ καὶ
ὑποστήν, ὁκόστω, καὶ ποδὶ καὶ ποδὶ
καὶ ποδὶ, καὶ, ὁκόστω καὶ ποδὶ,
καὶ ποδὶ

SECTIO IV. 81

17. Si cui sine febre cibi fastidium, oris ventriculi morsus, tenebriosa vertigo contigerit, & os amarulentum fuerit, hæc necessariam esse per superiora purgationem indicant.

18. Dolores supra septum transversum purgatione indigentes, medicamentum, quod per superiora purget, necessarium esse indicant. At qui septo transverso sunt inferiores, per inferiora.

19. Qui sumpta potione medica dum purgantur, non sitiunt, ii purgandi finem non faciunt, donec sitiverint.

20. Si dolor intestina torquens, & genuum gravitas, & lumborum dolor citra febrem adfuerint, medicamento quod
F 5 per

κάτω φαρμακείης δειδῶ σημαί-
νει.

κα'. Ὑποχωρήματα μέλαινα,
ἐκ τοῖν αἵμα μέλαινα, ἀπ' αὐτομάτης
ἰόντα, καὶ ξυνὸ πυρετῶ, καὶ ἄνθ
πυρετῶ, κάκιστα. καὶ ἐκόςσῃ ἂν τὰ
χεώματα ὑποχωρημάτων πλείω
πυρρότερα, ἢ μάλλον κάκιον. ξυνὸ
φαρμάκῳ ᾧ, ἄμεινον. καὶ ἐκόςσῃ ἂν
χεώματα πλείω ἢ, ἢ πυρρόν.

κβ'. Νοσημάτων ἐκόςσων ἀρ-
χομένων, συνὸ χολῇ μέλαινα ἢ ἄ-
νω, ἢ κάτω ἐπέλθῃ, θανάσιμον.

κγ'. Ὀκόςσῃ ἐκ νοσημά-
των ὀξείων, ἢ ἐκ πολυχρονίων,
ἢ ἐκ τραυμάτων, ἢ ἄλλως πῶς
λεπτυνόμενοις χολῇ μέλαινα, ἢ
ἐκόςσῃ.

SECTIO IV. 83

per inferiora purgat, opus esse significant.

21. Nigræ dejectiones, quavis sanguis niger, sponte procedentes, & cum febre & citra febrem, pessime, eoque peiores quo plures earum colores deteriores fuerint. A medicamento autem melius, quoque plures colores fuerint non pravi.

22. Per quorumvis morborum initia, bilem atram supra, vel infra prodire, lethale.

23. Quibus per morbos acutos, aut diuturnos, aut vulnera, aut alium quemvis modum extenuatis, bilis atra, aut veluti

84 HIPPOCRATES.

ὁκοῖται αἷμα μέλαι ὑπὸ λθῆ, τῇ
ὕστραϊν δὲ ποθεινέσιν.

κδ'. Δυσεντερῆν, ἐν δὲ τοῦ
λῆς μελάνης ἀρξῆται, θανάσι-
μον.

κε'. Αἷμα αἷον μὲν ὁκοῖται ἄν
ῆ, κακόν. κάτω δὲ, ἀγαθόν μέ-
λαι ὑποχωρήσιν.

κς'. Ἡ δὲ ὑπὸ δυσεντερῆς ἐχο-
μένη οἷον σάρκα ὑποχωρήσιν,
θανάσιμον.

κζ'. Οἱ κόποισιν ἐν τοῖσι πυ-
ρετοῖσιν αἱμορροαγῆς πλήθος ὁκο-
θενῶν, ἐν ταῖσι ἀναλύσιν, τυτέ-
ισιν αἱ κοιλίαι κεθυραίνονται.

κη'. Οἱ κόποισι χολάδια τὰ δια-
χωρήματα, κωφάσιος ὀπτηνομένη
παίει· καὶ ὁκοῖται κώφασιν, χελο-
δέσιν

SECTIO IV. 85

23. Si sanguis niger subierit, ii
post die moriuntur.

24. Intestinorum difficul-
tas, si ab atra bile ortum dux-
erit, lethalis.

25. Sanguis supra quidem,
qualiscunque fuerit emissus,
malus: infra autem, si niger de-
ciatur, bonus.

26. Intestinorum difficul-
tate vexato, si veluti carunculæ
ejiciantur, lethale.

27. Quibus per febres san-
guinis copia undecunque pro-
fluxerit, iis cum reficiuntur, al-
bum humidiores evadunt.

28. Quibus biliosæ sunt
exjectiones, hæ oborta surdi-
tate cessant, & quibus adest
surditas, his exortis bilio-
sis

δείων ὀπρηγομένων παύει.

κθ'. Ο'κόσσοις ἐν τοῖσι πυρετοῖσι
τοῖσιν ἐκταίοισιν ἐξοίσι ῥίγηα γίνε-
σθαι δύσχετα.

λ'. Ο'κόσσοις παρεξυσμοὶ γί-
νεται, ὡς ἂν ὥρῳ ἀφ' ἧς πυρετός
ἐς τὴν αὔριον τὴν αὐτὴν ὥρῳ ὡ-
λάβῃ, δύσχετα.

λα'. Τοῖσι κατώδεσσιν ἐν τοῖ-
σι πυρετοῖσιν, ἐς ἄρθεα καὶ πα-
ρὰ τὰς γνάθους μάλιστα αἱ δόπο-
σάσεις γίνονται.

λβ'. Ο'κόσσοις δὲ ἀνισταμένοι-
σιν ἐν τῇ νέσῳ τὶ πονέσθαι, ἐν ταύ-
τῃ αἱ δόποσάσεις γίνονται.

λγ'. Ἀτὰρ ὡς καὶ προπεπο-
νηκὲς πῆ ὡς ἔτι νοσέει, ἐν ταύτῃ
ἐπιρρίπτει ἢ ἔστος.

λδ'. Η'

SECTIO IV. 87

s dejectionibus finitur.

29. In febribus si rigores contingant sexto die, difficilem habent judicationem.

30. Quibus accessiones fiunt, quamcumque hora febris accesserit, si postero die, eadem, qua antea hora prehenderit, judicatio difficilis esse solet.

31. Quibus per febres lassitudinis sensus inest, iis ad articulos, potissimumque circa maxillas abscessus oriuntur.

32. Iis vero qui ex morbis convalescunt, si pars aliqua laboraverit, illic abscessus fiunt.

33. Sed & si pars quæpiam ante morbum laboraverit, in eam se morbus obfirmat.

34. Si

λδ'. Η'ν ὑπὸ πυρετῷ ἐχομένη
 να, οἰδήματα μὴ ἔντος ἐν
 φάρυγι, πρὶς ἐξαίφνης ἐπιχίγν
 ται, θανάσιμον.

λε'. Η'ν ὑπὸ πυρετῷ ἐχομένη
 ὁ τραχηλὸς ἐξαίφνης ὀπισθραφῆ
 καὶ μόγις καταπίνει δύνηται, οἰδή
 ματος μὴ ἔντος, θανάσιμον.

λς'. Ἰδρῶτες, πυρεταίνουσι
 καὶ ἄρξωνται, ἀγαθοὶ τετραῖοι,
 καὶ πεμπῆται, καὶ ἑβδομαῖοι, καὶ
 ἑνναταῖοι, καὶ ἐνδεκαταῖοι, καὶ τισ-
 σιπτεσκαίδεκαταῖοι καὶ ἑπτακα-
 ἑδεκαταῖοι, καὶ μίη καὶ εἰκοσῇ, καὶ
 ἑξήκοντι καὶ εἰκοσῇ, καὶ τριακοσῇ
 πρώτῃ, καὶ τριακοσῇ τετάρτῃ· ἔτοι-
 γοὶ οἱ ἰδρῶτες νόσος κρίνεται· οἱ δὲ
 μὴ ἔτι γινόμενοι, πόσοι σημαίνου-
 σι, καὶ

SECTIO IV. 89

34. Si febre vexato, nullo
existente in faucibus tumore,
repentina accidat strangulatio,
lethalis.

35. In febre vexato, collum
repente perversum, ac vix de-
clutire posse, nullo existente tu-
more, lethalis.

36. Sudores febricitanti-
bus boni, qui coeperint tertio
die, quinto, septimo, nono,
undecimo, decimoquarto, de-
cimoseptimo, vicesimo pri-
mo, vicesimo septimo, trice-
simoprimo, & tricesimo quar-
to: ii enim sudores morbos
iudicant. Qui vero tales non
sunt, laborem & morbi lon-
gitu-

Σι, καὶ μήκος ἰέσθ, καὶ ἐπὶ τρεπτα-
σμέε.

λζ'. Οἱ ψυχροὶ ἰδρώτις ξυλὸν
μὲν ὅξει πυρετῇ γινόμενοι. θά-
τατον· ξυλὸν θερμότερον δὲ, μή-
κος ἰέσθ σημαίνει.

λθ'. Καὶ ἔκκ' ἐν τῷ σώμα-
τι ἰδρῶς, ἐνταῦθα φεράζει τὴν
ἰέσθ.

λθ'. Καὶ ἔκκ' ἐν τῷ σώματι
θέρμει ἢ ψυχρῇ, ἐνταῦθα ἢ ἰέ-
σθ.

μα'. Καὶ ἔκκ' ἐν τῷ σώμα-
τι μεταβολαί, καὶ ὡς τὸ σῶμα κα-
ταψύχεται, ἢ αὖτις θερμαίνεται,
ἢ χρομαίεται ἐπὶ ἑτέρῃ γίνεται,
μήκος ἰέσθ σημαίνει.

μα'. Ἰδρῶς πολλὸς ἐξ ὑπνῶ
αἰθρῆς αἰτίας γινόμενος.
τθ

SECTIO VI. 91

gitudinem, ejusdemque reversionem significant.

37. Sudores frigidi in febre quidem acuta oborti, mortem; in mitiori autem, morbi prolixitatem significant.

38. Et ubi in corpore sudor inest, ibi morbum esse enunciat.

39. Et qua corporis parte calor inest, aut frigus, ibi morbus est.

40. Et ubi toto corpore mutationes contingunt, ut si corpus refrigeretur, rursumque calefiat, vel color alius ex alio oriatur, morbi longitudinem significat.

41. Sudor copiosus de somno citra manifestam causam obortus

τὸ σῶμα σημαίνῃ ἐπὶ πλείοντι
 τερφῆναι χεῖρ· ὡς δὲ τερφῶν ἢ
 λαμβάνοντι τῷτε γίγνῃ, σημαί-
 νῃ ὅτι κατὰ σίτος δίδῃ.

μζ'. Ἰδρῶς πολλὸς, ψυχρὸς ἢ
 θερμὸς ἀπὸ ῥέων, ὁ ψυχρὸς μείζων,
 ὁ δὲ θερμὸς ἐλάσσων ἵκται σημαίνῃ.

μς'. Οἱ πυρετοὶ ἐκείνοι μὲν
 διαλείποντες διὰ τρίτης ἰσχυρότε-
 ροὶ γίνονται, μᾶλλον δ' ἀπὸ κίνδυ-
 νοῦ· ἔτι δὲ ἂν πρότερον διαλείπω-
 σι, σημαίνῃ ὅτι ἀκίνδυνος.

μδ'. Οἱ ἐκείνοι πυρετοὶ μα-
 κροὶ, πεντήκοσι φύματα εἰς τὰ ἄρ-
 θρα, ἢ ὅσοι ἐκείνοιται.

μθ'. Οἱ ἐκείνοι φύματα εἰς
 τὰ ἄρθρα, ἢ ὅσοι ἐκείνοιται
 ἢ ὡς

SECTIO IV. 93

tus, corpus copiosiore uti cibo significat. Quod si cibum non assumenti istud contingat, quod evacuatione opus sit, indicat.

42. Sudor copiosus, calidus, aut frigidus semper fluens, frigidus majorem, calidus minorem morbum significat.

43. Febres quæ tertio quoque die vehementius affligunt, neque intermittunt, periculosiores. Quocunque autem modo intermiserint, extra periculum esse significant.

44. Quibus adsunt febres longæ, iis tubercula, vel ad articulos dolores innascuntur.

45. Quibus tubercula, aut ad articulos dolores post febres

G 3 lon-

ἢ μακρῶν γίνοντο, ἔτσι σιτίσας
πλείους χρόνον.

με'. Ἦν ῥῆγος ἐμπίπῃ πυ-
ρετῇ μὴ διαλείποντι, ἥδη ἐπι-
τείνονται, θανάσιμον.

μζ'. Αἱ ὑποχρέμψεις αἱ ἐν
τοῖσι πυρετοῖσι μὴ διαλείψουσιν
πελιδναί, καὶ αἱματώδεις, καὶ δυσ-
αίαι, καὶ χολώδεις, πάνσαι κα-
καί· ὑποχωρεῖσαι δὲ καλῶς, ἀγα-
θαί· καὶ κατὰ τὰς διαχωρήσεις, καὶ
κατὰ τὰ ἔργα. ὡς δὲ μὴ πᾶσι συμ-
φερόντων ἐκκρίνηται διὰ τῶν τό-
πων τέτων, κακόν.

μν'. Ἐν τοῖσι μὴ δια-
λείψουσιν πυρετοῖσιν, ὡς τὰ
μὲν ἴσως ψυχρὰ ἦ, τὰ δὲ ἐνδον
καίει.

SECTIO IV. 95

longas oriuntur, ii copiosioribus cibis utuntur.

46. Si febre non intermittente rigor frequenter incidat agro jam debili, lethale est.

47. In febribus non intermittentibus excreationes livida, sanguinea, graveolentes, & biliosa, omnes mala: bene autem si prodeant, bona, tum per alvi excreationes, tum per urinas. At si quid eorum quae non juvant per haec loca excernatur, malum.

48. In febribus non intermittentibus, si partes externae sint frigidae, internae ve-

κρίνται, καὶ δίψῳ ἔχῃ, θανάσι-
μοι.

μθ'. Εἴ μὴ διαλείποιτι πυ-
ρατὴ, καὶ χεῖλος, ἢ ὀφρὺς, ἢ
ὀφθαλμοί, ἢ ῥίς διασπαρῇ, καὶ
μὴ βλέπῃ, καὶ μὴ ἀκῇ, ἢ δὴ ἀ-
δυνάτος εἶναι τὸ σώματις, ὃ, πᾶν
πυρκαϊὴ γίνεται, ἐγγὺς ὁ θάνα-
τος.

ν'. Οἷον ἂν τῷ πυρκαϊῇ μὴ
διαλείποιτι δύσπνοια γίνεται καὶ
παρὰ φρεσὶν, θανάσιμοι.

να'. Εἴ τοῖσι πυρετοῖσιν ὀπ-
σύματα μὴ λυόμενα πρὸς τὰς
πυρκαϊὰς κρίναι, μακρὸς χρόνος ση-
μαίνει.

νε'. Οἷον οἰσίναν ἐν τοῖσι
πυρετοῖσιν, ἢ ὅς τῃσιν ἀλη-
θῶς ἐρρεσίησι καὶ προαίρεσιν
ὀφθαλμοί

SECTIO IV. 97

ro urantur, & siti vexentur,
lethale est.

49. In febre non intermit-
tente, si labrum, aut superci-
lium, aut oculus, aut nasus
pervertatur, si non videat, si
non audiat imbecillo jam cor-
pore, quicquid ex his even-
rit, in propinquo mors est.

50. Quando in febre non
intermittente difficultas spi-
randi, & delirium contigerit,
lethale.

51. In febribus quæ abscē-
dunt, si primis judicationibus
non solvantur, morbi longi-
tudinem significant.

52. Quibus in febribus, aut
aliis morbis oculi ex volunta-
te il-

ὁφθαλμοὶ διακρύβειν, ἔσθ' ἂν ἄπ-
τον. ἐκόσσοισι δὲ μὴ καὶ ποταίρε-
σιν, ἀποπώτερον.

ιγ'. Ο'κόσσοισι δὲ ὅπ' ἡ δόντων
ἐν τοῖσι πυρετοῖσι πείγλιχεα
γίνεται, ἰσχυρότεροι γίνονται οἱ
πυρετοί.

ιδ'. Ο'κόσσοισιν ὅπ' πολὺ ἐν-
χας ξηραὶ, βραχία ἱριθίζονται,
ἐν πυρετοῖσι καυσώδεις, ἔσθ' ἂν
νυ τοὶ διψώδεις εἰσίν.

ιε'. Οἱ δὲ βελῶσι πυρε-
τοὶ πάντες κακοὶ πλεονῶντες ἐφ' ἡμέ-
ραν.

ισ'. Πυρίεσσιπ ἰδρώς ὅπ' χυ-
μῶς, μὴ ἐκλείποντος τῷ πυρετῷ,
κακόν. μεμυῶς γὰρ ἢ ἰσσοι, καὶ ὁ-
χασίω πλείω σημαίνε.

ιζ'. Ἐπὶ

PHOR.
Co. 20 in
a 2 222
S E C T I O I V. 99

te illachrymant, nihil absur-
di accedit. At quibus præter
voluntatem, absurdus.

53. Quibus per febres ad-
dentes glutinosus humor ob-
nascitur, iis vehementiores
fiunt febres.

54. Quibus tussis sicca le-
viter irritantes in febribus ar-
dentibus diu perseverant, ii non
multum siti vexantur.

55. Ex glandularum inflam-
mationibus febres omnes ma-
la, præter diarias.

56. Febricitanti si sudor con-
tingat non deficiente febre, ma-
lum; prorogatur enim morbus,
multamque significat humidi-
tatem.

57. Si

16'. Ὑπὸ σπασμοῦ ἢ τιτάνε
ὑποχλονμίνου πυρετός ὀπιζόμε-
νος, λύει τὸ νόσημα.

17'. Ὑπὸ καύσου ἔχοντος
ὑποχλονμίνου ῥίγος, λύει τὸ νό-
σημα.

18'. Τριταῖος ἀκρότης κεί-
νεται ἐν ἀπὸ ἀναισθησίας τὸ μνησ-
ταται.

19'. Οἱ κόσσιπτοι ἀν' ἐν ταῖσι πυ-
ρεπῶσι τὰ ὅσα κωφεῖται, αἵμα
ἐν ῥιγῶν ῥυθμῶν, ἢ καὶ λίαν ἐκταρα-
χθεῖσα, λύει τὸ νόσημα.

20'. Πυρέσσονται μὴ ἐν αἰσθη-
σίᾳ ἡμέραν ἢ δύο ὁ πυρετός, ὅ-
που παύσειν αἰσθῆται.

21'. Οἱ κόσσιπτοι ἐν ταῖ-
σι πυρεπῶσι ἔκταται ὀπιζόμε-
ται.

SECTIO IV. 101

57. Si cui convulsione, aut distentione nervorum detento, febris successerit, morbum solvit.

58. Febre ardente detento, si rigor successerit, solutio contingit.

59. Tertianae exquisitae septem circuitibus, ut longissime, iudicatur.

60. Quibus per febres aures obsurduerunt, sanguis ex naribus profluens, aut alvus exturbata, morbum solvit.

61. Febricitantem, nisi diebus imparibus febris dimiserit, reverti solet.

62. Quibus per febres morbus regius ante diem septimum

την ποσὸν τὴν ἐπὶ τὰ ἡμέρων, κακόν.

ξγ'. Οὐκ ὁσίοισιν ἐν τοῖσι πυρετοῖσι καθ' ἡμέραν ῥίγηε γίνεσθαι, καθ' ἡμέραν οἱ πυρετοὶ λύουσθαι,

ξδ'. Οὐκ ὁσίοισιν ἐν τοῖσι πυρετοῖσι τῇ ἐξιδόμῃ, ἢ τῇ ἐνιάτῃ, ἢ τῇ ἐνδεκάτῃ, ἢ πενταεσκαμδεκάτῃ ἱκτεροὶ ἔπιγίνοιθαι, ἀγαθόν, ἀλλ' μὴ τὸ δεξιὸν ὑποχόνδριον σκληρὸν ᾗ. ἀλλ' οὐ μὴν, ἰσὺς ἀγαθόν.

ξε'. Ἐν τοῖσι πυρετοῖσι πρὸς τὴν καρδίαν καὶ μακρὰ ἰσχυρὸν καὶ καρδιαγμὸς, κακόν.

ξς'. Ἐν τοῖσι πυρετοῖσι τοῖσι δεξιῖσι οἱ σπασμοὶ καὶ οἱ πρὸς τὰ σπλάγχνα πῆτοι ἰσχυροὶ, κακόν.

ξζ'. Ἐν

SECTIO IV. 103

num obortus fuerit, malum.

63. Quibus in febribus
quotidie rigores, quotidie fe-
bres solvuntur.

64. Quibus per febres die se-
ptimo, aut nono, aut undeci-
mo, aut decimoquarto, mor-
bus regius obortus fuerit, bo-
num: nisi præcordia dextra du-
ra fuerint: alioqui minime bo-
num.

65. In febribus circa ven-
triculum æstus vehemens, &
toris ventriculi morsus, malo
est.

66. In febribus acutis con-
vulsiones, & circa viscera do-
lores vehementes, malum.

67. In

ξζ'. Εἰ τοῖς κυρετοῖς οἱ
ἐν τῷ ὑπὸν φόβοι ἢ σπασμοί,
κακοί.

ξη'. Εἰ τοῖς κυρετοῖς τὸ
πνεῦμα πρὸς πόνον, κακόν· σπασ-
μὸν γὰρ σημαίνει.

ξθ'. Οἱ κόπουν οὖρα παχία,
θερμὰ δὲ, ὀλίγα, ὡς ἀπυ-
ρίτοις, πλὴθος ἐπιδιδόν ἐκ τυ-
τάνων λεπτὸν, ὡφελίει. μάλιστα
διὰ τὰ τοιαῦτα ἔρχεται, οἷσιν ἐξ
ἀρχῆς, ἢ διὰ ταχέως ἐκίναται
σι ἰσχύει.

ο'. Οἱ κόπουν διὰ τοῦ κυρετοῦ
τὰ οὖρα ἀνατέταρα γυνή, οἷον
ἐκίναται, πετρίοις κεφαλα-
αλγίαι ἢ πᾶραισι, ἢ παρίσονται.

οα'. Οἱ κόπουν ἰσχυρὰ κρί-
νεται, πετρίοις ὅπνιφιλον ἰσχύει
τὸ

SECTIO IV. 105

67. In febribus per somnos pavores, aut convulsiones, malo sunt.

68. In febribus spiritus offensus malo est, convulsionem namque indicat.

69. Quibus non sine febre urinae sunt crassae, grumosae, & paucae, si ab iis copiosae, & tenues prodeant, juvant. Praecipue vero tales redduntur quibus ab initio, vel non multo post, sedimentum inest.

70. Quibus per febres urinae sunt returbidae, quales veterini generis, iis capitis dolor vel adest, vel aderit.

71. Quibus septimo die iudicatio contingit, iis urina rubram

τὸ οὖρον τῇ πεσάρτῃ ἱρυθρὸν, καὶ
τ' ἄλλα μὲν λόγον.

οδ'. Οὐκ ἐποισιν οὖρον διηφα-
νέει λευκὰ, ποικίλ'· μάλιστα δ' ἐν
ταῖσι φρεσικαῖσι ὅτε φαίνεται.

ογ'. Οὐκ ἐποισιν ὑποχόνδρια
ματίων διαδορδεύοντα, ὅσ-
φύος ἀλγύμετος ὅτε χυομένη, καὶ
κοιλία πετέοιζι καχυχαίνοντι,
ὡς μὴ φόσαι καταρραγέωσιν, ἢ
ἔρκε πληθὺς ἐπέλθῃ, ἐν πυρετοῖσι
διέ τεύεται.

οδ'. Οὐκ ἐποισιν ἐλπίς ἐς τὰ
ἄρθρα ἀφίσταται, ῥύει τῆς
ὑποστάσεως οὖρον πολὺ, καὶ πα-
χὺ, καὶ λευκὸν γενόμενον, οἷον
ἐν ταῖσι κοπώσεσι πυρετοῖσι
τεταται.

SECTIO IV. 107

bram die quarto nubeculam
habet, aliaque pro ratione.

72. Quibus urinæ pelluci-
dæ, albæ, malæ; præcipue ve-
ro in phreneticis apparet.

73. Quibus sublata præcor-
dia murmurant, lumborum
succeedente dolore, iis alvi hu-
meantur, nisi flatus deorsum
erumpant, aut urinæ copia pro-
deat. Atque hæc in febribus
contingunt.

74. Quibus speratur ali-
quid ad articulos abfcessurum,
urina copiosa, & crassa, & al-
ba reddita, abfcessu liberat,
qualis in febribus cum latiti-
tudi-

H 2

tudi-

ταταρταίσιον ἄρχεται εἰσοισι γί-
νειται. καὶ οἱ καὶ ἐκ τῆς ῥινῶν αἰ-
μορραγήσῃ, καὶ πάντοτε ταχὺ λυέ-
ται.

ρβ'. Ἦν αἷμα ἢ πύον ἔρρη,
τῆς ῥινῶν, καὶ τὸ κύστιος ἑλκώσῃ
σημαίνει.

ργ'. Οὐκ ὁποισι ἐν τῇ ἔργῃ πα-
χεῖ εἶναι σαρκία μικρά, ἢ ἄσπερ
τρίχες σωαζέρονται, τατέοισι
ῥητὶ τῆς ῥινῶν ἐκκρίνῃ.

ρδ'. Οὐκ ὁποισι ἐν τῇ ἔργῃ πα-
χεῖ εἶναι, πτυρώδεια σωαζέ-
ρονται, τατέοισι ἢ κύστις φώρεται.

ρε'. Οὐκ ὁποισι ὁποῖο ταυτομέγε-
θῃ ἔρρη, τατέοισι ὁποῖο τῆς
ῥινῶν φλεβίᾳ ῥητὶ σημαίνει.

ρς'. Οὐκ ὁπο-

SECTIO IV. 109

tudinis sensu quarto die quibusdam ferri incipit. Quod si ex naribus etiam sanguis effluerit, tum brevi admodum solutio fit.

75. Si sanguis, aut pus cum urina redditur, renum, aut vesicæ exulceratio significatur.

76. Quibus cum urina crassa exigua carunculæ, aut veluti capilli simul feruntur, iis à renibus excernuntur.

77. Quibus cum urina crassa furfuri similia quædam simul exeunt, iis vesica psoa laborat.

78. Qui sponte sanguinem cum urina effundunt, iis in renibus venulam ruptam esse significat.

H 3

79. Qui-

ΠΟ ΗΙΡΡ. ΑΡΗΟΚ.

εθ' Ο'κόςοισιν ἐκ παλ' ἔρσο
λαμψάδα ὑφίστα), τετίοι-
ζιν ἑλόςτις λιθίφ.

ω'. Η'ν αἶμα ἔρεη κ' θρόμ-
βας, κ' τραχύριω ἔχη, κ'
οδωύη ἱμπίπηη ἐς τὸ ὑπευγά-
σθειν κ' ἐς τὸ περίεγον, τὰ πρὶν
πλὴν κύστιν ποιῇ.

σα'. Η'ν αἶμα κ' πύον ἔρεη,
κ' λαπίδας, κ' ὁσμὴν βαρεῖν ἦ,
τὴν κύστις ἔλασσει σημεῖν φ.

πζ'. Ο'κόςοισιν ἐν τῇ ἔρσο
θρῆ αἶμα φύει), τετίοισι, δια-
σπύσσαντες κ' ἀεθαλῆτες, λού-
σις.

αγ'. Οἱ μὲν ἰούκτωρ πολ-
λὰ

SECTIO IV. III

79. Quibus in urina arenosæ sunt subsidentia, iis vesica calculo laborat.

80. Si quis sanguinem, & grumos cum urina fundat, & stranguriam habeat, dolorque in anum ventrem, & interfoemineum incidat, quæ ad vesicam attinent, laborant.

81. Si quis sanguinem, & pus, & squamulas cum urina fundat, gravisque odor adsit, vesicæ exulcerationem significat.

82. Quibus in urina fistula tuberculum innascitur, eo in pus verso, & rupto, solutio contingit.

83. Urina copiose de nocte

H 4

red-

ἀντινομία, σμικρὰ τὴν ὑπε-
χώρησιν σημαίνει.

Τμήμα σέμνητον.

Α'.

Σ Πασμὸς ἐξ ἰλλεΐδου, θανάσιμος.

Β'. Ἐπὶ τεύματι ασπασμὸς
ὀπτηνόμενος, θανάσιμος.

Γ'. Αἵματος πολλῆς ῥυέντες,
ασπασμὸς ἢ λυγμὸς ἐπιγλυόμενος,
κεκόν.

Δ'. Ἐπὶ ὑπερκαθάρσει ασπασ-
μὸς ἢ λυγμὸς ἐπιγλυόμενος, κε-
κόν.

Ε'. Ἦν μὲν ἰσχυρὸς ἐξ αίματος
ἄσπαστος πρὸς γένεσιν, ασπασμὸς
ὀπτηνόμενος, ὡς μὴ πυρετὸς
ὀπτι-

SECTIO IV. 113

De reddita, paucam alvi dejectionem significat.

Sectio Quinta.

I.

Convulsio ex veratro,
lethalis.

2. Convulsio quæ in vulnus incidit, lethalis.

3. Ex copioso sanguinis fluxu convulsio, aut singultus contingens, malum denunciat.

4. Ex profusa purgatione convulsio, aut singultus succedens, malum.

5. Si ebrium quempiam vox deficiat derepente, convulsus moritur, nisi eum febris prehens-

ὀπιλάει, ἃ ἐς τὴν ἑρῶν ἰλθὼν
καθ' ἡν αἱ κραιπάλαι λήναι,
φθίγγει.

ε'. Οἵοσι ὑπὸ πύλαις ἀ-
λίσκονται, ἐν τέσσαρσιν ἡμέρῃσιν
ἀπέλκνται. ἡ δὲ πᾶντας δια-
φύλασιν, ὑγιέει γίνοιτο.

ζ'. Τὰ ὀπιληπικὰ οἰόσιν
ὅτι τὴν ἕβην γίνοιτο, μετὰ τὰς
ἰσθ. οἰόσιν δὲ πάντες καὶ εἶκοσιν
ἡμέρας γίνοιτο, πεντήκοσι τὰ πολλὰ
ζῶντες γίνοιτο.

η'. Οἵοσι πλεονεκτοὶ γινώ-
σκονται ἐκ ἀναγκαζαίοντος ἐν πο-
σαρισκαίδικα ἡμέρας, πεντήκο-
σιν ἐς ἑμπόνημα μεδίσει.

θ'. Φθίσις γίνεται μάλιστα
ἡλικίᾳ τῇσιν ὅτι ὀκτωκαί-
δικα

SECTIO VI. 115

hendat, aut qua hora crapula solvi solet, ad vocem redeat.

6. Qui nervorum distentione corripuntur, intra quatuor dies percunt, quos si effugerint, sanescunt.

7. Comitiales quibus ante pubertatis annos contingunt, depositionem accipiunt. At quibus quintum & vigesimum annum agentibus fiunt, eos fere ad mortem usque comitantur.

8. Qui morbo laterali laborant, nisi intra dies quatuordecim repurgentur, iis in suppurationem deponitur.

9. Tabes praeique contingit aetatibus, quae sunt ab anno deci-

ὁκτα ἐτίων μέχρι πάντε καὶ τριή-
κοιτα.

ι'. Οὐκ ὁσίοισι κυκλῶν δια-
φυύχουσιν, ἐς τὸν πνεύμοιοα τρέ-
πεται, ἐν ἐπὶ αὐτῇ μέρησιν ὁποθνήσ-
κουν· ὡς ὅτε ταύτας διαφύχουσιν,
ἐμπνυοὶ γίνονται.

ια'. Τοῖσιν ὑπὸ τῷ φθισίῳ
ὀνοχλυμένοιςιν, ὡς τὸ πύσμα
ἐπὶ αὐτῷ ὁποθνήσκουσιν βαρὺ ὅσον
ἐπὶ αὐτῷ ἐπιχρόματον, καὶ
αὐτὸς τῷ ὁποθνήσκουσιν ἐπὶ κεφαλῇ
ρίωσιν, θάλασσαν.

ιβ'. Οὐκ ὁσίοισιν ἀν φθισίῳ
σιν αὐτῷ τῷ ὁποθνήσκουσιν ἐπὶ κεφαλῇ
ρίωσιν, ἐπὶ διαρροίῃς ἐπιχρό-
ματὶς ὁποθνήσκουσιν.

ιγ'. Οὐκ ὁσίοισι αἷμα ἀφρώδεις ἀ-
ναπύουσιν, ταχέουσιν ἐκ τῷ πνεύ-
μοιο αὐτῷ ἐπιχρόματὶς ὁποθνήσκουσιν.

ιδ'. Ὑπὸ

PHOL.
S E C T I O V. 117

decimo octavo ad trigessimum
quintum.

10. Qui anginam effugiunt,
iis in pulmonem vertitur, &
intra dies septem intereunt,
quos si evaserint, suppurati
fiunt.

11. In tabe vexatis, si spu-
tum quod tussi rejiciunt, car-
bonibus infusum gravem odo-
rem emittat, & capilli è capite
defluant, lethale est.

12. In tabidis si capilli è ca-
pite defluant, ii succedente al-
vi profluvio, moriuntur.

13. Qui spumantem sangui-
nem spuito rejiciunt, iis ex pul-
mone educitur.

14. Tabe

14'. Ὑπὸ φθίσιος ἰχθυήσας
διάρροια ὀπιζομένη, θανατώ-
σας.

15'. Οἵ κότε ἐν πλερίπιδος
ἔμψυτοι γίνονται, ὡς βασιλικὰ θέρ-
μασιν ἐν πεσσεύοντα ἡμέρησιν
ἐφ' ἧς ἂν ἡ ῥῆξις γένηται, παύον-
ται, ὡς δὲ μὴ, εἰς φθίξιν μεθί-
σκει.

16'. Τὸ θερμὸν ἐλάττει ταῦ-
τα τοῖς πλεονέκτε χρεομένοις·
σπαρκῶν ἐκ θήλειων, νεύρων ἀκρά-
τειαν, γινώσκεις γάρ κωσιν, ἀμφο-
ράγας, λειποθυρίας· ταῦτα οἷσι
θανάτος.

17'. Τὸ δὲ ψυχρὸν σπασμὸς,
τετανός, μαλασμός, καὶ ῥίγητα
πυρετώδεια.

18'. Τὸ

SECTIO V. 119

14. Tabæ detento succedens
alvi profluvium, lethale.

15. Qui ex morbo laterali
suppurati fiunt, si intra dies
quadraginta, ex quo ruptio fa-
cta est, repurgentur, liberan-
tur, alioqui in tabem trans-
eunt.

16. Calidum eo frequen-
tius utentibus has adfert no-
xas, carniū effœminatio-
nem, nervorum impotentiam,
mentis stuporem, sanguinis
profluvia, animi defectiones, ad
quæ mors sequitur.

17. Frigidum vero convul-
siones, nervorum distentiones,
denigrationes, & rigores febri-
les.

18. Fri-

iii'. Τὸ ψυχρὸν πολέμιον ὁσέ-
οισιν, ὁδύσει, νεύσει, ἐγκέφαλον,
ιωπαίῳ μυελῷ. τὸ δὲ θερμὸν ὠ-
φέλιμον.

iv'. Οἷόντα κατὰ ψυχρῶν, ἐκ-
θερμαίνειν δεῖ, πάλιν ἰκόντα αἵματι
ῥαγέει, ἢ μέλει.

v'. Ἐλκεσι τὸ μὲν ψυχρὸν
δακτυλῶδες, δέρμα σφεισκακρυῖν,
ἐδόντιον ἀνεκπύοντον ποιεῖν, με-
λασμοὺς, ῥίγια πυρετώδη, σπυρ-
μὰς, καὶ τῆτάνας.

vi'. Ἐστὶ δὲ ὅκτι τῆτάνη
ἀνὲρ ἑλκεος ἰώθης ἀσάρκη. Θέρπος
μείων, ψυχρὸν πολλὴν κατὰ χροῖς
ἐπανάκλησιν θέρμης ποιεῖται.
θέρμη δὲ πάντα ῥύει.

vii'. Τὸ

SECTIO V. 121

18. Frigidum ossibus adver-
sum, dentibus, nervis, cere-
bro, dorsali medullæ: cali-
dum vero utile.

19. Perfrigerata excaleface-
re oportet, præter ea, quæ san-
guinem effundunt, aut brevi
effundent.

20. Frigidum ulcera mor-
det, cutem obdurat, dolorem
inflammabilem facit, denigra-
tiones, rigores febriles, con-
vulsiones, nervorum distentio-
nes.

21. Quandoque tamen in
nervorum distensione absque
ulcere, in juvene quadrati cor-
poris, æstate media, frigida
copiosa perfusio caloris revo-
cationem efficit: calor autem
hæc sanat.

I

22. Ca-

κβ'. Τὸ θερμὸν ἐκπυκτικόν,
 ὃν ὅπῃ παντὶ ἔλκει, μέγιστον
 σημεῖον ἐς ἀσφαλείην· δέρμει
 μέλας, ἰχθυεῖ, ἀνώδυνος,
 ῥιγέων, σπασμῶν, τετάνων πα-
 ρηγεῖκός. τὴν δὲ ὡς τῇ κεφα-
 λῇ κερασαίην λύει. πλείστον δὲ
 διαφέρει ἐσέων κατὰ γαστρίαν, μά-
 λιστα δὲ τοῖς ἐψλωμένοις. τε-
 τάνων δὲ μάλιστα τοῖς ἐν κεφαλῇ
 ἔλκει ἰχθυεῖ· καὶ ὅσοι ἐπὶ ψύ-
 χους θύσκει ἢ ἐλαττωθῇ. καὶ ὁρπι-
 σι, ἰσχυροῖσι, ἰσχυροῖσι, αἰσθίῳ,
 ὑσέρῃ, κύστῃ, τυττίοις τὸ θερ-
 μὸν φίλον καὶ κερνόν· τὸ δὲ
 ψυχρὸν πολέμιον καὶ κλέων.

κγ'. β'

22. Calidum suppuratio-
nem movens, non in omni ul-
cere, maximum securitatis in-
diciū exhibet, cutem emol-
lit, extenuat, dolorem tollit,
rigores, convulsiones, nervo-
rum distentiones mitigat, capi-
tis gravitatem solvit, ossium
vero fracturis plurimum con-
fert; sed præcipue his, quæ car-
ne nudata sunt, iisque maxime,
qui in capite ulcera habent.
His etiam quæ à frigore emo-
riuntur, aut exulcerantur, &
herpetibus exedentibus, sedi,
pudendo, utero, vesicæ, iis o-
mnibus calidum gratum, & in-
dicationem faciens, frigidum
vero inimicum, & interimens.

κγ'. Ἐν ταῖσι δὲ δεῖ τῶν
 ψυχῶν χρεῖσθαι, ὁκόθεν αἰμορρία-
 γίη ἢ μέλη, μὴ ἐπ' αὐτὰ, ἀλλὰ
 πρὸ αὐτὰ ὁκόθεν ἐπιρρεῖ καὶ ὁκίσται
 φλεγμοναὶ ἢ ἐπιφλογίσματα ἐς
 τὸ ἐρυθρὸν καὶ ὑφαίμον ῥέποντα
 νεκρῶσιν, ὅπῃ ταῦτα· ἐπεὶ
 τάχα παλαιὰ μολαίνῃ· καὶ ἐρυσί-
 πθας τὸ μὴ ἐλατύνειν ὡφελεί· ἐπεὶ
 νόσος ἐλατύνειν βλάπτῃ.

κδ'. Τὰ ψυχῶν, οἷον χῶν,
 πύσθαι, τῶν εἰς πόλεμια,
 ἀσπίων κισσῶν, αἰμαρρῶν καὶ
 σπληνῶν.

κε'. Τὰ δὲ ἐκ ἀφροδισιῶν οἰδή-
 ματα

23. At frigido in his utendum unde sanguis profluit, aut paulo post fluxurus est, non supra ipsas partes, sed circa eas unde profluit, adhibito. Et si quæ inflammationes, aut incendiosa quædam ad rubrum, & suberuentum ex recenti sanguine vergunt, ad ea admota. Inveterata namque denigrat. Erysipelas etiam non ulceratum juvat, siquidem exulceratum lædit.

24. Frigida, veluti nix, & glacies pectori sunt adversa, rasses movent, sanguinis eruptiones, & destillationes efficiunt.

25. Articularum tumores, & dolo-

ματα κ' ἀλγήματα ἄτερ ἑλκεος,
καὶ ποδαγρικὰ, κ' σπασματα,
σπέντων τὰ πλείστα τὸ ψυχρὸν
πολλὸν καταχρόμιον ῥιζὴν τε κ'
ἰχθυαίνην, κ' ὀδυνην λύει. νάρκη
γὰρ μετρίη ὀδυνην λυπικὴ.

κς'. Ὑδὼρ τὸ ταχέως θερ-
μαινόμενον, κ' ταχέως ψυχόμενον,
κεφάταιον.

κζ'. Οἰκτισμοὶ δὲ πένθιμοι
ρίξεις νύκτωρ, τοῖσι πάνσι δι-
ψασίν, καὶ ὀπκοιμνηθῶσιν, ἀγα-
θόν.

κδ'. Γνωσκίτωσαν ἀγνοῶντες ὅτι
ἀρώματα πυρρὰ· πολλαχῇ δὲ κ'
εἰς ἄλλα χρυσίμα ἀν' ἡμῶν,· εἰ μὴ
καρφηθείας ἐκποιήσιν.

κε'. Τὰς εὐδίας φαρμα-
κείας

SECTIO V. 127

dolores absque ulcere, & podagricas affectiones, & convulsa, hæc magna ex parte frigida large effusa levat, & minuit, doloremque solvit. Moderatus namque torpor dolorem solvendi facultatem habet.

26. Aqua quæ cito calefcit, & cito refrigeratur, levissima.

27. Quibus bibendi de nocte appetentia est, iis admodum sitientibus, si obdormierint, bono est.

28. Odoramentorum suffitus muliebria educit, & ad alia plerumque utilis esset, nisi capitis gravitatem inferret.

29. Utrum gerentibus pur-
I 4 gao-

128 HIPPOCRATES.

καὶ τὴν, ὡς ὁργᾶ, τιτράμικα,
καὶ ἄλλαι ἐπὶ τὰ μιλῶν, ἴσως ἢ ταύ-
τας. τὰ ἢ ἡπια καὶ ὀρισβύπερα
ἀλαδῶν καὶ χεῖ.

α'. Γυναικὶ ἐν γαστρὶ ἐχού-
σῃ ὑπό πνος τῆς ὀξείας νεσημα-
των ληθθύναι, θανάσιμον.

αα'. Γυνὴ ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ
φλεβοτεμνηθεῖσα ἐκτιτρώσκει, καὶ
μᾶλλον εἰ μείζον εἴη τὸ ἔμβρυον.

αβ'. Γυναικὶ αἷμα ἐμείσῃ,
τῆς καταμύσειω ῥαγένται, λύσεις
γίνεσθαι.

αγ'. Γυναικὶ τῆς καταμύσειων
ὀφθαλμῶν, αἷμα ἐκ τῆς ῥινὸς
ῥυκῶσαι, ἀγαθόν.

αδ'. Γυναικὶ ἐν γαστρὶ
ἐχούσῃ ὡς ἢ κοιλίᾳ πολλὰ ῥιμῇ,
ἀνδρ-

SECTIO V. 129

gantia medicamenta exhibenda sunt, si humor impetu feratur ad excretionem, quarto mense, & ad septimum usque, sed his minus. In maioribus autem, & grandioribus foetibus subtimide se gerere oportet.

30. Mulierem utero gerentem, morbo quopiam acuto corripitur, lethale.

31. Mulieri uterum gerenti vena secta abortionem facit, idque potissimum, si foetus grandior fuerit.

32. Mulieri sanguinem vomitione rejicienti, menstruis erumpentibus solutio contingit.

33. Mulieri menstruis deficientibus sanguis ex naribus profluens, bono est.

34. Mulieri utero gerenti, si alvus multum profluat,
I s abor-

κίνδυνος ἐκτεῖναι.

λκ'. Γυναικὶ ὑπὸ ὑστερικῶν
ἐποχλημάτων, ἢ δυστοκίᾳ, πῖαρ-
μός οὐκ ἐκφυγόντων, ἀνατίθω.

λς'. Γυναικὶ τὰ κατὰ μήνιν
ἀχρεῖα, καὶ μὴ κατὰ τὰ αὐτὰ αἰεὶ
γινόμενα, καθάρσιος δεικνύει ση-
μείων.

λζ'. Γυναικὶ ἐν γαστρὶ ἔχον-
τι καὶ μετὰ τοὺς ἐξ αἱμάτων ἰσχυροὺς
ζήλους, ἐκτείνεσθαι.

λθ'. Γυναικὶ ἐν γαστρὶ ἔχον-
τι καὶ ὁ ἔκτρος μετὰ τοὺς ἰσχυροὺς ζήλους
τῶν δίδυμων ἔχοντι, θάπτεον ἐκ-
τείνεσθαι. καὶ καὶ μὲν οἱ δίδυμοι ἰ-
σχυρὸς γίνονται, τὸ ἄρσεν. καὶ ὁ
ἀρσενικός, τὸ θῆλυ.

λθ'. Η'

abortionis periculum est.

35. Mulieri uteri strangulatu vexata, aut difficultate partus laboranti sternutatio succedens, bono est.

36. Mulieri menses decolores, neque semper eadem periodo procedentes, purgationem indicant esse necessariam.

37. Mulieri utero gerenti, si mammae de repente gracilescent, abortionis periculum est.

36. Mulieri utero gemellos gerenti, si altera mamma gracilis evadat, alterum abortu edit, & siquidem dextra mamma gracilescent, marem: si vero sinistra feminam.

132 HIPPOCRATES.

λθ'. Η'ν γυνή μὴ κύστα,
μαδὲ τετοκῆα γάλα ἔχη, ταύτη
τὰ κατὰ μῆνια ἐκλέλοιπε.

μ'. Γυναξὶν ἀκόρησιν ἐς τοῦ
τιτθῆς αἷμα συστέφεται, μανίῳ
σημαίνει.

μα'. Γυναίκα ἢ θήλυς εἰδέ-
ναι εἴ κύψ, ἐπὶ τὴν καρδίαν μέλας,
μαλίκρητον διδόναι πρὶν, καὶ ὡς μὲν
σρόφον ἔχη πρὶν τὴν γαστέρα,
κύψ· ὡς δὲ μὴ, ἢ κύψ.

μα'. Γυνή ἔγκυος, εἴ μὲν
ἀρρὶν κύψ, ὅς τις ἐστὶν· ὡς ὅθι
λυ, δύσχευς.

μα'. Η'ν γυναικὶ κύστις ἐρυ-
σίπελας ἐν τῇ ὑστέρη γίνηται, θα-
νατῶδες.

μαδ'. Ο'κίσται παρὰ φύσιν
λεπίει.

39. Si mulier quæ neque
gravida est, neque peperit, lac
habet, ei menstrua defece-
runt.

40. Mulieribus quibus ad
mamas sanguis in tumorem
colligitur, furor significatur.

41. Si nosse velis num mu-
lier conceperit, ei dormitura
aquam mulsam propinato, & si
ventris tormina eam corripue-
rint, concepit; sin minus, non
concepit.

42. Mulier prægnans, si ma-
rem gestat, coloratio est: si fœ-
minam, minus colorata.

43. Mulieri prægnanti ery-
sipelas in utero, lethale.

44. Quæ præter naturam
tenuēs

λεπία ἔχει ἐν γαστρί ἔχει·
ἐκπνέουσαι πρὶν ἢ παχυθῆ-
ναι.

μτ'. Οὐκ ὅσαι διὰ ματρίας τὸ
σῶμα ἔχει ἐκπνέουσαι δι-
μύα καὶ τρίμύα ἄτερ ποροφά-
σιος φαιρῆς, ταύτησι αἱ κοτυλη-
δόνες μύξης μασταί εἰσι, καὶ ἐδύ-
ναται κρατεῖν ὑπὸ τῆ βάρους τὸ
ἔμβρυον, ἀλλ' ἀπορήγνυσθαι.

μς'. Οὐκ ὅσαι παρὰ φύσιν
παχέαι εἶναι μὴ ξυλλαμβάνου-
σιν ἐν τῇ γαστρί, ταύτησι τὸ ὄπι-
πλον τὸ σῶμα οὐκ ὑπερέωσι ἀπο-
πέζει, καὶ πρὶν ἢ λεπιοθῆναι,
ἐκύνει.

μς'. Ἦν ὑσέρη ἐν τῷ ἰχίῳ ἐγ-
κείμενη διαπυήσῃ, ἀνάγκη ἔμ-
ματος γένεσθαι.

μκ'. Εἰ μ-

tenuēs utero gerunt, obortiunt
donec pleniores evadant.

45. Quæ mediocri corporis
habitu præditæ, foetus bime-
stres, aut trimestres absque oc-
casione manifesta abortione
excludunt, iis uteri acetabula
(Græci ποταμόδυνας vocant)
mucoris plena sunt, neque præ
pondere foetum continere pos-
sunt, sed abrumpuntur.

46. Quæ præter naturam
crassæ non concipiunt, iis o-
mentum os uteri comprimit,
neque prius quam extenuen-
tur, prægnantes efficiuntur.

47. Si uterus, qua parte ad
ooxam incumbit, suppuratus
fuerit, cum per linamenta me-
dicamento convenienti illita
curari est necesse.

47. Ma-

μη'. Εμβρυα, τὰ μὲν ἔρ-
σινά ἐν τοῖσι δεξιόισι, τὰ δὲ
θῆλαι ἐν τοῖσιν ἀριστεροῖσι μάλ-
λον.

μθ'. Εἰν ὑστέριον ἐμπλάσιας
παραμικὸν ἐπιτιθεῖς, ἐπλαμβά-
νειν τὸν μυκτῆρα καὶ τὸ σόμα.

ν'. Γυναικὶ τὰ κατὰ μήνιν
ὡς βέλῃ ἐπιχεῖν, σικύλω ὡς μα-
γίσλω πρὸς τὸν τήθεος πρὸς-
βαλλεῖ.

να'. Οἰκίται ἐν γαστρὶ ἔχου-
σι. τετάρτον τὸ σόμα τῷ ὑστέριον
συμμέμικται.

νε'. Ἡ γυναικὶ ἐν γαστρὶ ἔ-
χουσα γάλα πολὺ ἐν τῷ μα-
ζῶν ῥύθμῳ, ἀδυνάεις τὸ ἔμβρυον ση-
μαίνει. ὡς δὲ στερεοὶ οἱ μαζοὶ ἴω-
σιν, ὑγιεινότερον τὸ ἔμβρυον ση-
μαίνει.

νζ'. Οἰκό-

SECTIO V. 137

48. Mares uteri dextra parte,
foeminæ sinistra magis gestan-
tur.

49. Ut secundæ excidant,
sternutatorio naribus appposito,
neas, & os comprimito.

50. Mulieri si voles men-
strua sistere, cucurbitulam,
quam maximam ad mammas
appone.

51. Quæ utero gerunt, iis
uteri os connivet.

52. Mulieri uterum geren-
ti, si lac copiosum è mammis
effluat, foetum imbecillum in-
dicat: Quod si solidæ mam-
mæ fuerint, valentio rem foe-
tum significant.

K

53. Quæ

ιγ'. Ο'κόσται διαφθείρουν μέλα-
 λας τὰ ἔμβρυα, ταύτησιν οἱ
 πλείστοι ἰχνοὶ γίνονται. ὡς δὲ πάλιν
 σκληροὶ γίνονται, ὁδυνήσεται ἢ ἐν
 τοῖσι πλείοσι, ἢ ἐν τοῖσιν ἰχίοι-
 σιν, ἢ ἐν τοῖσιν ὀφθαλμοῖσιν, ἢ
 ἐν τοῖσι γένεσι, καὶ ἐ διαφθεί-
 ρονται.

ιδ'. Ο'κόσται τὸ σῶμα τῶν
 ὑπερέων σκληροὶ ὄντι, ταύτησιν ἀ-
 γάγνη τὸ σῶμα τῶν ὑπερέων ξυμ-
 μύειν.

ιε'. Ο'κόσται ἐν γαστρὶ ἰχνοὶ
 ὑπὸ πυρετῶν λευκάνονται, καὶ
 ἰσχυρῶς ἰσχυαίνονται ἀνὰ περὶ
 τοῦ φαεινῆς, τίκτεται χαλεπὴ
 καὶ ὀπκινδυνῶς, ἢ ἐκπνέουσιν
 σφοδρὰ κινδυνεύουσιν.

ις'. Ἐπὶ ῥόφῳ γυναικείῳ
 σπασμὸς καὶ λειποθυμία ὡς ὅτι γί-
 νεται, καὶ οὕτως.

ιζ'. Καὶ

PHOR.
S E C T I O V. 139

53. Quæ foetus corrupturæ sunt, iis mammae extenuantur. Quod si contra duræ evadant, dolor erit vel in mammis, vel in coxis, vel in oculis, vel in genibus, (neque foetum cor-
rumpunt.

54. Quibus os uteri durum est, iis connivere os uteri necesse est.

55. Quæcunque utero ge-
rentes febribus detinentur, &
vehementer extenuantur citra
manifestam causam, ex diffi-
cultate, & cum periculo pariunt,
aut in abortionis periculum in-
cidunt.

56. In fluore muliebri si con-
vulsio accedat, & animi defe-
ctio, malo est.

K 2

57. Men-

νζ'. Καταμύειον γομύνων
πλειόνων νῆσοι ξυμβαίνουσι· καὶ
μὴ γνομύων, ὅπο τῆς ὑσέρης
ξυμβαίνουσι νῆσοι.

νη'. Ἐπὶ ἀρχῇ φλεγμαίνοντι,
καὶ ὅπῃ ὑσέρη φλεγμαίνεσθαι, ὅπῃ
νεφερίσιν ἐμπύοισι σφαγῆσθαι ὅπῃ
γίνεσθαι. ὅπῃ ὅ ἔστι φλεγμαίνον
τι λυγξὸς γίνεσθαι.

νθ'. Γυνὴ λυγξὸς μὴ λαμβάνη ἐν
γαστρὶ, βέλῃ δὲ εἰδέναι εἰ λήψα
ται, πρὸς ἀλυσίας ἱματίοισι συ
μμία κάτω· καὶ μὴ πορεύεσθαι
σοι ὁδὸν ἢ ὁδὸν διὰ τῆς σώματος
ἐς τὰς ῥῆσας καὶ ἐς τὸ στόμα, γί
νωσκει ὅπῃ αὐτὴ ἐστὶ ἐν τῇ αἰσ
τὸς ἐστίν.

ξ'. Ἦν γοιαικὴ ἐν γ
ἐπὶ ἐχέσθαι αἱ καθάρσεις πρὸς
ρῶσθαι

57. Mensibus copiosioribus
profluentibus morbi contin-
gunt, & non prodeuntibus ab
utero morbi eveniunt.

58. Ad recti intestini, & u-
teri inflammationem, renesque
purulentos stranguria succedit.
At jecore inflammatione labo-
rante, succedit singultus.

59. Si mulier non concipiat,
cure autem expetit num conce-
ptura sit, vestibis undique ob-
soluta per inferna suffitum ap-
posito, & si odor quidem ad
nares, & os usque per corpus ti-
bi pervadere videatur, ipsam
non ex sese infocundam esse
scito.

60. Si mulieri utero ge-
niti purgationes eant, foetus
K 3 ut be-

ρδύωνται, ἀδύνατον τὸ ἐμβρυον
ὁμαίνειν.

ξα'. Ἡ'ν γυναῖκα καθάρσεις
μὴ πορεύωνται, μήτε φρίκας,
μήτε πυρίτῃ ἐπίχτομένε, ἄσφα
διὰ αὐτῇ προσπίπτωσι, λογίζου
ταύτῃ ἐν γαστρὶ ἔχειν.

ξβ'. Ο'κόσαι ψυχὰς καὶ σπυ
κνὰς τὰς μήτρας ἔχειν, ἢ
κωίσκωσι, καὶ ὀκόσαι καθύστερ
εἰ τὰς μήτρας, ἢ κωίσκωσι
δοποδέννυται γὰρ αὐταῖς ὁ γόνος
καὶ ὀκόσαι ξηρὰς μάλλον καὶ φεικ
ῆς. ἐνδείη γὰρ τῆς τροφῆς φθεί
ρεται τὸ σπέρμα. ὀκόσαι δὲ ἐν
ἀμφοτέρω τῷ καὶ ἔχειν
σύμμετρον, αἱ τοιαύται δὴ περὶ
γίνουσι.

ξγ'. Πά

PHOR.
n 143
S E C T I O V. 143

ut bene valeat fieri non potest.

61. Si mulieri purgationes non prodeant, neque horrore, neque febre succedente, ciborum vero fastidia ei accidant, gravidam esse existimato.

62. Quæ frigidos, & den-
fos habent uteros, non concipiunt, neque quæ præhumidos habent: siquidem in ipsis genitura extinguitur. Et quæ plus aquo ficcas, & adurentes: alimenti namque inopia semen corrumpitur. At quæ ex utrifque moderatam naturæ sunt temperiem, ex foecundæ evadunt.

K 4 63. Ea-

Ξγ'. Παραπλησίως δὲ καὶ
ὅτι τῶν ἀρρίνων· ἢ γὰρ δι' ἀραιό-
τητα τῶν σάμας τὸ πνεῦμα
ἔξω φέρεται, πρὸς τὸ μὴ ταρ-
πέμειν τὸ σπέρμα· ἢ διὰ τὴν
πυκνότητα τὸ ὑγρὸν ἢ διαχωρεῖ
ἔξω· ἢ διὰ τὴν ψυχρότητα ἐν ἐκ-
πυρεσίᾳ, ὥστε ἀδροῖζεσθαι πρὸς τὸ
τόπον τῆτον, ἢ διὰ τὴν θερμ-
σίαν τὸ αὐτὸ πρὸς γίνεσθαι.

Ξδ'. Γάλα διδόναι κεφαλαλ-
γίας, κακόν. κακὸν ἔτι πυρεταί-
ναι, καὶ οἷον ὑποχένδρια ματέα-
ρα διαδορορίζονται, καὶ πῶσι δι-
ψώδεσι κακόν· καὶ ἐξ ἐχολώδεσσι αἱ
διαχωρήσεις, καὶ ἐν τοῖσιν ὅξέσι πυ-
ρετοῖσιν ἐξείσι, καὶ οἷσιν αἵματις πολ-
λὴ διαχώρησις γέγονεν. ἀρμόζει
δὲ

SECTIO V. 145

63. Eadem vero ratio est in maribus: aut enim propter corporis raritatem spiritus foras dissipatur, ita ut ne semen transmittat: aut propter densitatem humor foras non excernitur: aut ob frigiditatem non accenditur, ut ad eum locum cogatur: aut ob caliditatem hoc idem contingit.

64. Lac exhibere capite dolentibus, malum. Malum item & febricitantibus, & quibus præcordia sublata murmurant, & siticulosi. Malum quoque & quibus biliosæ sunt dejectiones, quique febre acuta laborant, & quibus copiosa sanguinis dejectio facta est. Attabis

K 6

bidis

εἰς τοῖσι φθινώδεσι μὴ λίαν πολ-
 λὰ πυρέσκει διδόναι γάλα, καὶ
 εἰς πυρετοῖσι μακροῖσι καὶ βλη-
 ροῖσι, μηδενὸς τῆς χειρ-
 μένων σημείων παρόντος, παρὰ
 λόγον δὲ ἐκτετακός.

ξδ'. Οὐκόσποιν οἰδήματα ἐφ'
 ἑλκυσ φαίνεται, ἔμμελα σπιν-
 ται, ἔδὲ μαίον· τέτειον εἰς
 ἀφαιδιέντων ἐξαίφνης, τοῖσι μὲν
 ὀπίσθιν, σπασμοί, τέτεινοι· τοῖ-
 ςι δὲ ἐμπροσθεν, μανία, ἢ ὀ-
 δυνάει πλῆρ' ὀξεία, ἢ ἐμπύη-
 σις, ἢ δυσεντερία, καὶ ἐρυθρὰ ἢ
 τὰ οἰδήματα.

ξε'. Ἦν τραυμάτων ἰχυροῦ

PHOR.
S E C T I O V. 147

bidis lac dare convenit, non valde admodum febricitantibus, & in febribus longis, & languidis, dum nullum ex supra commemoratis signis adfuerit, & præter rationem extenuatis.

65. Quibus cum ulceribus tumores conspiciuntur, ii fere neque convelluntur, neque in furorem aguntur. At iis repente evanescentibus, quibus quidem id à tergo incidit, convulsiones, & nervorum distentiones fiunt. Quibus vero à fronte, furores, aut lateris dolores acuti, aut puris collectio, aut intestinorum difficultas, si rubri tumores fuerint.

66. Si magnis, & pravis existen-

έόντων κ' πονηρόν, εἰδύματα μὲν
φαίνεται, μέγα κακόν.

ξζ'. Τὰ χυδία, χησά· τὰ δὲ
ἐνυμα, κρηά.

ξη'. Τὰ ὀπίθεν τ' κεφαλῆς ὀ-
δυνώμενα, ἢ ἐν μετώπῳ ὀρθῇ
φλέψι τμηθεῖσα, ὠφελείη.

ξθ'. Ρίγια ἄρχεται γυναιξί
μὴ ἐξ ὀσφύος μᾶλλον, κ' διὰ τώ-
τα εἰς κεφαλῆς. ἀνδράσι δὲ μᾶλ-
λον ὀπίθεν ἢ ἐμπροσθεν τ' σώμα-
τος. οἷον ὅσοι τε πηχέων καὶ μηρῶν.
ἀτὰρ κ' τὸ δέρμα ἀραιόν· δηλοῦ
ἵ τῆτο ἢ θείξ.

ε'. Οἱ ὑπὸ τεταρταίων ἀ-
λίσκομενοι, ὑπὸ σπασμοῦ ἐ-
παύει ἀλίσκονται. ὡς δὲ ἀλί-
σκων

SECTIO V. 149

stentibus vulneribus tumor non conspiciatur, ingens malum.

67. Molles boni, ac crudi mali.

68. Ei, qui parte capitis posteriore dolet, recta in fronte incisa vena, prodest.

69. Rigores mulieribus quidem initium ducunt ex lumbis magis, & per dorsum ad caput perveniunt. Quinetiam viris parte corporis posteriore magis, quam anteriore, veluti ex cubitis, & femoribus. Quod & indicat cutis raritas, quam etiam pilus ostendit.

70. Qui quartanis corripiuntur, fere convulsione non tentantur. Quod si prius corripiantur,

150 ΗΙΡΡ. ΑΡΗΘΚ.

σκων] ὀρόπερι, αἵτα ὀπυγίαν
ταμ πιπαρταίος, ταύον].

θκ'. Ο'κόσοισι διέρματα ἀει-
τινι] καρφαλέα κὺ σκληρά, ἀνδ
ιδρώτων τελευτῶσιν. ὀκόσοισι δὲ
χαλαρά κὺ ἀραιά, σὺν ιδρώτι τε-
λευτῶσιν.

οδ'. Οἱ ἰκτερίδες ἔσταν π
αιδυματιάδες εἰσιν.

Τμήμα ἕκτον.

Α'.

Ε'Ν τῇσι χερσίησι λαοῖ-
πρίησιν ὀξυρεϊμίσιν ὀπι-
γμομένῃ, μὲν γμομένῃ
ὀρόπερι, σημεῖον ἀγαθόν.

β'. Οἷον ῥῖος ὕψι-
ρα

SECTIO VI. 151

piantur, deinde quartana succedat, liberantur.

71. Quibus cutis obtenditur arida, & dura, ii sine sudore moriuntur: at quibus laxa, & rara, cum sudore vitam finiunt.

72. Qui morbo regio laborant, non multum flatulenti sunt.

Seçtio Sexta.

I.

IN diuturnis intestinorum lævitatibus, si ructus acidus, qui antea non extitit, succedat, bonum est signum.

2. Quibus nares natura sunt

ἐκ φύσεως, καὶ ἡ γῆ ὑγρότερη, ὑ-
γραίνεσι νοσήσασιν. οἷον ὅ τὰ
ναίτια, ὑγρύνουσιν.

γ'. Ἐν τῇ μακροῦ διασπεί-
ρῃσι αἰσθησιμία, κακόν, καὶ σω-
πυρετικόν κακόν.

δ'. Τὰ εὐαίσθητα ἔλκεα,
κακοήθεια.

ε'. Τὰν ὀδυώων καὶ ἐν πλῆθει-
σι, καὶ ἐν σήθει, καὶ ἐν τοῖσιν ἄλ-
λοιπιν, ἡ μίξα διαφέρει, κα-
ταμαρτυρεῖται.

ς'. Τὰ νεφρετικὰ καὶ ὀκρόστα κα-
τὰ πῦρ κύστιν ἀλγύματα, ἐργω-
δῶς ὑγάζεσθαι τοῖσι πρὸς βύτησι.

ζ'. Τὰ ἀλγύματα τὰ κατὰ πῦρ
καὶ λίαν γαστρίδα, τὰ μὲν με-
τίωρα,

PHOR.
S E C T I O V. 155

sunt humidiores, & genitura
humidior, ii morbosiore sunt
valetudine, at quibus contra-
ria sunt, salubriore.

3. In longis intestinorum
difficultatibus cibi fastidia ma-
lum denuntiant, & cum febre
pejus.

4. Ulcera undiquaque gla-
bra, maligna.

5. Dolores & in lateribus,
& in pectore, & in cæteris par-
tibus, num multum differant,
perdiscendum.

6. Renum, & vesicæ vitia
in senibus ægre curantur.

7. Dolores qui ad ventrem
tunt, sublimes quidem, le-
L vio-

τίωρα, κρυφότερα· τὰ δὲ μὴ με-
τίωρα, ἰσχυρότερα.

η'. Τοῖσιν ὑδροπικοῖσι τὰ γυ-
νόμματα ἔλκεα ἐν τῇ σόματι, ἢ
ῥηϊδίως ὑγιάζει.

θ'. Τὰ πλατῆα ἐξαρθύμα-
ται ἐπ' αὐτὴν πενησμένωδε.

ι'. Κεφαλῶν πονέοντι καὶ πε-
ριωδυνέοντι, πύον, ἢ ὕδωρ, ἢ
αἷμα ῥυέν καὶ τὰς ῥίνας, ἢ καὶ τὴν
σόμα, ἢ καὶ τὰ ὦτα, λύει τὸ ἰε-
σμεν.

ια'. Τοῖσι μελαγχολικοῖσι κα-
τοῖσι γαστρικοῖσιν αἱμορροΐδαι
ὀπτηγνόμματα, ἐξαρθόν.

ιβ'. Αἱμορροΐδας ἐν θέντι
χρονίας, καὶ μὴ μίαν φυλαχθῆ-
κένδυνος ὑδροπτα ἐπ' αὐτοῖς,
ῥηϊσίαν.

ιγ'. Ἰ.

PHOL.
S E C T I O VI. 155

viiores : non sublimes vero,
vehementiores.

8. Aqua inter cutem labo-
rantibus, orta in corpore ulce-
ra, non facile sanantur.

9. Pustulæ latæ raro pruri-
ginosæ.

10. Capite dolenti, ac vehe-
menter laboranti, pus, aut a-
qua, aut sanguis per nares, vel
os, vel aures effluens, morbum
collit.

11. Melancholicis affecti-
bus, & renum vitiis succe-
dentes hæmorrhoides (hoc est,
sanguinis profluvium per ora
venarum in ano sanguinem
undere solita) bono sunt.

12 Diuturnum sanguinis pro-
fluvium per ora venarum quæ
in ano sunt hæmorrhoidas di-
cunt) curanti, nisi una serve-
tur, periculum est ne aqua inter
cutem, aut tates succedat.

L 2

13. Sin-

156 HIPPOCRATES.

17. Τὸ αὐγμῆ ἐχομένη
πάρμοι ἐπιχρῶμενοι, λύσει τὸν
αὐγμόν.

18. Τὸ ὕδρωπος ἐχομένη,
εἴ κ' ἢ τὰς φλέβας ἐς τὴν κοιλίαν
ὑδατος ῥυέντος, λύσει.

19. Τὸ διάρροϊας ἐχομένη
μακρῆς δὲ ταυτομάτης ἑμετης
ἐπιχρῶμενος, λύει τὴν διάρροϊαν.

20. Τὸ πλερίπδος ἢ ὑπερ-
πνεύμονις ἐχομένη διάρροϊα
ἐπιχρῶμενος, κακόν.

21. Ο'φθαλμοὶ αἰσθάνονται
διάρροϊας λευκῶν, ἀγαθόν.

22. Κύστιν διακοτέντι, ἢ
ἐγκέφαλον, ἢ καρδίαν, ἢ φρέ-
νες,

PHOR.
SECTIO VI. 157

13. Singultu detento, si
ernutamenta accedant, sin-
ultum tollunt.

14. Aqua inter eutem de-
ento, ubi aqua ex venis in
entrem confluxerit, morbus
olvitur.

15. Longo alvi profluvio de-
ento, spontanea accedens vo-
nitio, alvi profluvium solvit.

16. Morbo laterali, aut pul-
monum inflammatione confi-
ato, succedens alvi proflu-
um, malum.

17. Lippitudine laboran-
um, alvi profluvio corripit, bo-
um.

18. Cui vesica perfecta fuerit,
ut cerebrum, aut cor, aut se-

L 3 ptum

νας, ἢ τῶν ἐντέρων τὶ τῶν λε-
πιδῶν, ἢ κοιλίῳ, ἢ ἕταρ, θανα-
τῶδες.

ιβ'. Ἐπὶ τὴν διακαπῆ ὁσέον,
ἢ χόνδρος, ἢ νύκλον, ἢ γνάθος το-
καπῆν, ἢ ἀκροποδίῃ, ἔτε αὐξεται
ὅτι τε ξυμφύεται.

κ'. Ἡ'ν ἐς τὴν κοιλίῳ αἷμα
ἐκχυθῆ παρὰ φύσιν, ἀνάγκη ἐκ-
πληθύνει.

κα'. Τοῖσι μαινομένοισι, κερ-
σῶν ἢ αἱμαρροΐδων ἐπιγλυομένων
τῇ μαλίστης λύσει.

κβ'. Ο'κείσα ῥήγματα ἐν τῇ
νότῃ ἐς τοὺς ἀγκῶνας ηραβαίνῃ
φλεβοτομίῃ λυθῇ.

κγ'. Ἡ'ν φόβος καὶ θυσ-
σύμῃ πολλῶν χύσιον διατε-
λεί.

ptum transversum, aut tenue
quoddam intestinum, aut ven-
triculus, aut jecur, lethale est.

19. Os cum perfectum fue-
rit, aut cartilago, aut nervus,
aut genæ tenuis particula, aut
præputium, neque augetur, ne-
que coalescit.

20. Si sanguis in ventrem
præter naturam effusus fuerit,
ut in pus vertatur necesse est.

21. Infanientibus si varices,
aut sanguinis profluvium per o-
ra venarum, quæ in ano sunt,
(hæmorrhoides dicuntur) ac-
cesserint, insanix solutio.

22. Rupta, quæ ex dorso ad
cubiti articulos descendant,
venæ sectio solvit.

23. Metus, & tristitia
si diu perseverent, melan-
cho-

λέη, μελαγχολικόν τὸ τοῖσιν.

κδ'. Εὐντέρων λιὰ διακοπὴ
τῶν λεπτῶν τε, ἐξυμφύει.

κε'. Εὐρυσίπελας ἔξωθεν μὲ εἴ.
πυτρίπιδος, ἐκ ἀγαθόν· ἔσωθεν
τῶν ἔξω, ἀγαθόν.

κς'. Οὐόσοιζιν ἂν ἐν τοῖς
καύσοιζι τρύμοι γίνονται, παρὰ
κοπήν λυφ.

κζ'. Οὐόσοι Εὐμπυοὶ ἢ ὑδρω-
πικοὶ καίονται ἢ τέκνοντι, ἐκρυ-
έντος τῶν πυτρίπιδος ἢ τῶν ὑδατος ἀθρόου,
πάντως ὑπόλυνται.

κη'. Εὐνέχει ἐκ ποδαγριῶσιν,
ἐκ δὲ φαλακροῖ γίνονται.

κη'. Γυνὲς ἐκ ποδαγριῶν, λιὰ
μὲν

SECTIO VI. 161

cholix istud indicium est.

24. Ex tenuioribus intesti-
nis si quod perfectum fuerit,
minime coalescit.

25. Erysipelas foras effusum
intro verti, minime bonum:
at ab interioribus foras, bonum.

26. Quibus in febribus ar-
dentibus tremores contingunt,
delirium solvit.

27. Qui pus thorace colli-
gunt, aut aqua inter cutem la-
borant, si uruntur, aut secan-
tur, aut pus; aut aqua confer-
tim effluxerit, omnino inter-
cunt.

28. Eunuchi neque poda-
gra laborant, neque calve-
scunt.

29. Mulier podagra non
L 5 labo-

μη τὰ κρετα μὲν αὐτὴ ἐκλείπῃ.

λ'. Πᾶς ἔποδα γειᾶ πρὸς τὴν
ἀσθενείαν.

λα'. Ο'δύνας ὀφθαλμῶν ἀ-
κρητοποσίη, ἢ λατρεὶν, ἢ πυρίη, ἢ
φλεβοτομίη, ἢ φαρμακείη λύει.

λβ'. Τρευλοὶ ὑπὸ διαρροίας
μάλιστα ἐλίσκονται μακρῶς.

λγ'. Οἱ ἰξυρτυμίδες ἔσθ-
λουσι υλδύρατικοὶ γίνονται.

λδ'. Ο'κόσοι φαλακροὶ, τυτίει-
σι κερσοὶ μεγάλοι ἐγίνονται. ὁκό-
σοις δ' ἐν φαλακροῖς ἔχουσιν κερ-
σοὶ ὀπιγέγονται, πάλιν ἔπει γί-
νονται δασεῖς.

κε', Τυδο

SECTIO VI. 163

laborat, nisi cum menstrua de-
cecerint.

30. Puer podagra non ten-
tatur ante venereorum usum.

31. Oculorum dolores meri-
potio, aut balneum, aut fomen-
tum, aut venæ sectio, aut me-
dicamentum purgans exhibi-
tum solvit.

32. Balbi longo alvi proflu-
vio maxime corripuntur.

33. Qui acidum eructant,
non admodum morbo laterali
tentantur.

34. Qui calvi sunt, iis vari-
ces magni non fiunt: at quibus
calvis existentibus varices suc-
cedunt, iis rursum capillitium
gignitur.

35. Aqua

λδ'. Τοῖσιν ὑδρωπικῶσι βίη
ἐπιγλυκομένη, κακὴν.

λε'. Δυσκρίων φλεβοτομῶν
λύψις. τὰ μὲν δὲ τὰς εἴσω.

λς'. Ὡς πρὸ κινῶστος ἐχομένη
οἰδήμα γλυκὴ ἐν τῇ τραχήλῳ, ἀ-
καθόν· ἔξω γὰρ τὴν ἐπέχον τὸ νέουσιμα.

λϛ'. Οἱ νέουσισι κρυπτοὶ χειρῶν
τοὶ γίνονται, μὴ θεραπεύειν βέλ-
τιον. θεραπευόμενοι γὰρ ἀπολλύονται
ταχέως· μὴ θεραπευόμενοι δὲ
πλείω χρόνον διατελεῖσι.

λθ'. Στασιμὸς γίνεται ἢ ὑπὸ
πληρώσεως, ἢ κενώσεως, ἔπειτα δὲ καὶ
λυγμός.

μ'. Οἱ νέουσισι πρὸς τὸ ὑπερ-
χρόνδιον πόνοι γίνονται ἀπὸ
φλεβοτόμης, πυρετοῦ, πυρετοῦ
ἐπὶ

SECTIO VI. 165

35. Aqua inter cutem labo-
rantibus tussis accedens, malo
est.

36. Urinæ difficultatem ve-
næ sectio solvit : secundæ au-
tem sunt interiores.

37. In angina detento, si tu-
mor in cervice oriatur, bonum:
foras enim morbus vertitur.

38. Quibus canceri occulti
oriuntur, eos non curare præ-
stat. Curati namque cito per-
eunt, non curati vero diutius
perdurant.

39. Convulsio ex repletio-
ne, aut vacuatione oritur, ita
vero etiam singultus.

40. Quibus ad præcordia
dolores citra inflammatio-
nem oriuntur, iis febris suc-

cc-

ὅτι γλυκύμυρος αὐτὸν ποιεῖ.

μα'. Οὐκόσσοι διακρύουσι τὸ
ἐκ τοῦ σώματος μὴ διασημαίνεσθαι, τὸ
τέτοις διὰ παχύτητα τῆς αἵματός,
καὶ τὸ πῦρ, καὶ διασημαίνεσθαι.

μβ'. Ἐν τοῖσιν ἰκτερικαῖσι
ἥπαρ σκληρὸν γινώσκουσιν, ποικίλως.

μγ'. Οὐκόσσοι σπληνώδε
ὡς δὲ συστεινέρις ἀλίσκονται, τὸ
τέτοις ὅτι γλυκύμυρος μακρὸς
δυστεινέρις, ὡς δὲ ὅτι γινώσκονται
ἢ λεπτέρις, καὶ ἀπόλλυνται.

μδ'. Οὐκόσσοις ἐκ τῆς
γαστρὸς εἰλεὸς ὅτι γινώσκονται, ἐν ἐπὶ
ἡμέρησιν ἀπόλλυνται, ὡς μὴ περὶ
τοῦ ὅτι γλυκύμυρος ἀλλὰ τὸ ὅτι ἐν ῥύτῳ

μα'. Ε'

SECTIO VI. 167

edens dolorem solvit.

41. Quibus suppuratum ali-
quod in corpore existit, neque
se significationem edit, iis
b puris, aut loci crassitudi-
nem sui indicium non exhibet.

42. Morbo regio laboranti-
us jecur durum fieri, malum.

43. Lienosi, qui difficultate
intestinorum corripuntur, iis
post longam succedentem inte-
stinalium difficultatem, aqua
inter cutem, aut lævitas intesti-
norum accidit, & moriuntur.

44. Quibus ex stranguria
volvulus succedit, intra diem
septimum moriuntur, nisi fe-
re accedente copiosa urina
fluat.

45. Ul-

μβ'. Εἴληα ἐκόσα ἐνιαύς
γίνεται, ἢ μακρότερον χρό-
νον ἔχουσιν, ἀνάγκη ὅσον ἀφίστα-
σθαι τὰς ἑλκας καίλας γίνεσθαι.

μγ'. Οἱ κόσι ὑβρί ἐξ ἀδμ-
τος ἢ ἐν χρόνῳ γίνονται παρὰ τὴν ὑβρί
δοσολογία.

μδ'. Οἱ κόσι φλεβοτομία,
φαρμακία ζυμφίρη, τυτέες πα-
σῆκον τὴν ἥρεν φλεβοτομείν, ἢ φα-
ρμακία.

με'. Τοῖσι σπληνώδεσι δύσ-
πνοιαν ἐπιγινώσκουσιν, ἀγαθόν.

μς'. Οἱ κόσι ποδαγρικὰ
εἴματα γίνονται, ταῦτα δὲ πο-
δαγρικὰ ἐκ παλαιότητος ἢ
ἐκ τῆς ἀποκαθίσταται.

ν'. Οἱ κόσι

SECTIO VI. 169

45. Ulcera annua quæcun-
que fuerint, aut longius tem-
pus habuerint, os abscedere est
neceſſe, & cicatrices cavas fie-
ri.

46. Qui gibboſi ex anhe-
latione, & tuſſi ſiunt, ante pu-
ertatem moriuntur.

47. Quibus venæ ſectio, &
medicamentum purgans con-
ſert, iis venam vere ſecare, aut
medicamentum purgans exhi-
bere convenit.

48. Lienoſis accedens inte-
ſtinalium difficultas, bono eſt.

49. Podagræ morbi, intra
quadrageſimum depoſita
inflammatione, ſuſſiſtunt.

M

50. Qui-

170 ΗΙΡΡ. ΑΡΜΟΒ.

ν'. Ο'κόποιπιν ἄν ὁ ἰσκέφα-
λος διακαπῇ, πετέοιζιν ἀνάγκη
πυρετὸς καὶ χολῆς ἔμμεται ἐπιγι-
νέσθῃ.

να'. Ο'κόποισιν ὑγαινέσθιν ὁ-
δυώκει γίνοντ' ἰξείφους ἐν τῇ κε-
φαλῇ, καὶ παραχρῆμα ἄφρονες
γίνοντ' καὶ βέλχεσθιν, ὑπόλλω-
ται ἐν ἱπλά ἡμέρησιν, καὶ μὴ πυ-
ρετὸς ὑπλάσθῃ.

νε'. Σκοπεῖν δεῖ καὶ καὶ τὰ
ὑποφάτια τῶν ὀφθαλμῶν ἐν τοῖς
ὕπνοις. καὶ γὰρ πᾶσι ὑποφαίνα
ξυμβαλλομένων τῶν βλαφάρον
ἀδυνά, μὴ ἐκ διαρροῖας ἐν τῇ, ἢ
φαρμακοποσίης, φλαδρον τὸ σ-
μῆεν, καὶ διανατῶδες σφρόδρα.

εγ'. Αἱ παραφροσύναι,

SECTIO VI. 171

50. Quibus perfectum fuerit cerebrum, iis febrem, & bis vomitionem succedere necesse est.

51. Quibus bene valentibus capitis dolores derepente contingunt, statimque voce deficiunt, & stertunt, intra dies septem pereunt: nisi febris eos prehenderit.

52. Spectare vero oportet quæ etiam ex oculis per somnum subapparent. Etenim si quid ex albo non commissis palpebris subappareat, neque id ex alvi profluvio, aut medicamenti portione contingat, primum signum est, & lethale admodum.

53. Deliria quæ cum risu
M 2 fiunt,

172 HIPPOCRATES.

μὲν μὲν γέλωτες γινόμενα ἀσφα
λέσονται. αἱ δὲ μὲν σπυγδαῖς ἐπιπρά
λέσονται.

νδ'. Ἐν τοῖσιν ὁξέσι πᾶσι
τοῖσι μὲν σπυγδαῖς, αἱ κλαυθμώ
δεις ἀναπνοαὶ, καὶ αἱ.

νι'. Τὰ ποδαγρικὰ καὶ ἡ ἡρως
καὶ φθονώρως κινεῖται ὡς ὅτι τ
πολύ.

νς'. Τοῖσι μυαγχοῖσι νη
σῆμασιν ἐς τὰς ἐπικίνδυνους
ἀποσκήψας, ἢ ἀποπληξίαν
ζώματος, ἢ σπασμὸν, ἢ μανίαν
ἢ τύφλωσιν σημαίνουσι.

νζ'. Ἀπόπληκτοι δὲ μάλα
στε γίνονται ἡλικίᾳ τῇ δὲ τῇ
σπράκοντι ἐτίαν ἄλλοι ἐξήκο
τα.

νη'. Ἡ δὲ ἐπίπλησιν
πίσι.

SECTIO VI. 173

sunt, tutiora : at quæ studio
adhibito, periculosiora.

53. In morbis acutis cum
febre, gemebundæ spirationes,
malæ.

55. Podagræ vitia vere, &
autumno fere moventur.

56. Morborum melancholi-
corum periculosi decubitus,
aut corporis syderationem, aut
convulsionem, aut furorem,
aut cæcitatem denunciant.

57. At corporis syderationes
contingunt ea ætate maxime,
quæ est à quadagesimo ad sexa-
gesimum.

58. Ubi omentum excide-
rit,

M 3

xit,

πύου, ἀνόςκη δοποσαπλώαι.

ιβ'. Ο'κόσσιον ὑπὸ ἰχιά-
δος ἀνδρακμήνοισι χροίνε ἐξίσα-
ται τὸ ἰχίον, καὶ σάλιν ἐμπίπλει
τυτέοισι μεξαιθρίονον).

ξ'. Ο'κόσσιον ὑπὸ ἰχιάδος
ἀνδρακμήνοισι χροίνε, τὸ ἰχίον
ἐξίσαται, τυτέοισι τήκη τὸ σκά-
ρος, καὶ χαλδεται, ὡς μὴ
πρυθῶται.

Τμήμα

e, computrescere necesse est.

59. Quibus coxendicis dolore confictatis, coxendicis articulus suo loco excidit, ac rursus recipitur, iis mucrores infascantur.

60. Quibus diuturno coxendicis dolore confictatis, femoris caput suo loco excidit, iis crus tabescit, & claudicant, nisi curantur.

M 4

Seçio

Τμήμα ἑβδόμον.

Α'.

Ε'Ν τοῖσιν ὁξέσι νεζήμασ
ψύξις ἀκρωτηρίων, κακόν.

Β'. Ε'πὶ ὁσέσιν νοσέοντι σὰρξ
πελιδνή, κακόν.

Γ'. Ε'πὶ ἐμέτω λυγρὴ καὶ ὁ
φθαλμοὶ ἄρυθροι, κακόν.

Δ'. Ε'πὶ ἰδρώτι φρίκη, καὶ
χρυσόν.

Ε'. Ε'πὶ μαλὴν δυσεντερίᾳ, ἢ
ὑδρωΐ, ἢ ἐκτασις, ἀγαθόν.

Σ'. Ε'πὶ νεσῶ πολυχρονίᾳ ὄππο-
σιτίν καὶ ἄκρητοι ἐπεχωρήσιες, κα-
κόν.

Ζ'. Ε'πὶ

Seçtio Septima.

I.

IN acutis morbis extremorum refrigeratio mala.

2. Caro livida ex osse agrotante, malum denuntiat.

3. Ex vomitione singultus, & oculi rubentes, malo sunt.

4. Ex sudore horror, minime bonus.

5. Ex furore intestinorum difficultas, aut hydrops, aut vehemens mentis emotio (*ex-
sitis* dicitur) bono est.

6. In morbo diuturno ciborum fastidium, & sincerae dejectiones, malum denuntiant.

M s.

Ex

ζ'. Εἰς πολυποζίνε ῥίγος καὶ
παρεφροσύνη, κακόν.

η'. Εἰς φύματος εἶσω ῥήξεω
ἐκλυσσε, ἱματός, καὶ λευκοψυχία
γίνεθ.

θ'. Εἰς αἵματος ῥύσθ παρε-
φροσύνη ἢ καὶ σπασμὸς, κακόν.

ι'. Εἰς εἰλεῶ ἱματός, ἢ λυγξ,
ἢ σπασμὸς, ἢ παρεφροσύνη, κα-
κόν.

ια'. Εἰς πλῆριπιδι ἀειπιδ-
μοσίη, κακόν.

ιβ'. Εἰς ἀειπιδμοσίη φρε-
νίτις, κακόν.

ιγ'. Εἰς καύμασιν ἰσχυροῖσι
σπασμὸς, ἢ τίπαιος, κακόν.

ιδ'. Εἰς πληγὴν εἰς τὴν καθα-
λὴν ἐκπληξίς, ἢ παρεφροσύνη,
κακόν.

ιθ'. Εἰς πᾶ

SECTIO VII. 179

7. Ex multo potu rigor, & delirium, malum.

8. Ex rupto intro tuberculo exolutio, vomitio, & animi defectio contingit.

9. Ex sanguinis profluvio deliratio, aut etiam convulsio, malo est.

10. Ex morbo tenuioris intestini (ileum dicunt) vomitio, aut singultus, aut convulsio, aut delirium, malum.

11. Ex morbo laterali pulmonis inflammatio, malo est.

12. Ex pulmonis inflammatione phrenitis, malum denunciat.

13. Ex vehementibus ardoribus convulsio, aut nervorum distentio, malo est.

14. Ex ictu in capite accepto, stupor, aut desipientia malo est.

15. Ex

14. Ε'πὶ αἵματι πύσθ' ὡς
πύσθ' ἡσυχόν.

15. Ε'πὶ αὐτῇ πύσθ' ὡς
ἡσυχόν. ἐπὶ δὲ τὸ πύσθ' ἡσυχόν
ὡς ἡσυχόν.

16. Ε'πὶ φλεγμονῇ τῇ ἡπατο
αὐτῇ ἡσυχόν.

17. Ε'πὶ ἀγρυπνίᾳ αὐτῇ ἡσυχόν
παρεφροσύνη, κακόν.

18. Ε'πὶ ὅσῃ ψιλῶσθ' ἡσυχόν
πύσθ'.

19. Ε'πὶ ἡσυχίᾳ αὐτῇ ἡσυχόν
ὡς ἡσυχόν, κακόν.

20. Ε'πὶ ἡσυχίᾳ αὐτῇ ἡσυχόν
ὡς ἡσυχόν, κακόν.

21. Ε'πὶ

SECTIO VII. 18¹

15. Ex sanguinis sputo, puris sputum, malum.

16. Ex puris sputo tabes, & fluxus : ubi vero sputum sistitur, moriuntur.

17. Ex jecoris inflammatio singultus, malo est.

18. Ex vigilia convulsio, vel delirium, malum.

19. Ex ossis nudatione erysipelas.

20. Ex erysipelate putredo, aut suppuratio, malum.

21. Ex vehementi, & conspicuo in ulceribus arteriarum perflu, sanguinis eruptio, malum.

22. Ex

κβ'. Ε'πὶ ὀδύνη πολυχρονίῃ
ἔξω πρὸς τὴν κοιλίαν ἐκτίσεις.

κγ'. Ε'πὶ ἀκρότατο ὑποχωρήσας
δυσεντερίῃ, κακόν.

κδ'. Ε'πὶ ὀσέεσσι διακοπὴ παρα-
φροσύνη, ὡς καὶ τὸν λάβη.

κε'. Ε'κ φαρμακοποσίης ἀπα-
σμίς, θαιατῶδες.

κς'. Ε'πὶ ὀδύνη ἰσχυρῇ ἔξω
πρὸς τὴν κοιλίαν ἀκροτηρίων ψύ-
ξις, κακόν.

κζ'. Γνωστικὴ ἐν γαστρὶ ἰχθύος
πυλίσμους ὀπληρόμενος, ἐκ τῶν
σας ποιήσας.

κη'. Ο' π' ἂν ὀσέον, ἢ χρόν-
ος, ἢ ἰσχυρὴ διακοπὴ ἐν τῇ
σώ-

SECTIO VII. 183

24. Ex diuturno partium,
quæ ad ventrem attinent dolo-
re, suppuratio.

23. Ex sincera alvi egestio-
ne intestinorum difficultas.

24. Ex osse perfecto deli-
rium, si ad vacuum usque pe-
netravit.

25. Ex medicamento purgan-
tis potione convulsio, lethalis.

26. Ex vehementi partium,
quæ ad ventrem attinent dolo-
re, extremorum refrigeratio,
mala.

27. Mulieri utero gerenti si
crebra, & inanis desidendi vo-
luntas (tenesmus dicunt) ac-
cesserit, abortum facit.

28. Os quodcunque, vel car-
tilago, vel nervus in corpore
præ-

σώματα, ἔτι αὐξάνει, ἔτι ξυμ-
φύεται.

κθ'. Ἡ'ν ὑπὸ λελυγμένη φλέγμα-
τες ἐχρησάμεθα διάρροια ὅπως γένηται
ἰσχυρὴ, λύει τὴν νόσον.

λ'. Ο'κόσοισιν ἀφρώδεια τὰ
διαχωρήματα ἐν τῇσι διαρροίαισι,
τεταίοισιν ὑπὸ τῇ κεφαλῇ ταῦτα
καταρρέει.

λα'. Ο'κόσοισι πυρίσσειν ἐν
τοῖσι ἔργοις κρημνώδεις αἱ ὑπο-
στάσεις γίνονται, μακρὸν τὴν ἀρ-
ρώστῳ σημαίνει.

λβ'. Ο'κόσοισι δὲ χολώ-
δεις αἱ ὑποστάσεις, ἀνωθεν δὲ
λεπτὰ, ὀξύϊν ἀρρώστῳ σημαί-
νει.

λγ'. Ο'κόσοισι δὲ διεση-
κόται τὰ ὄρα γίνονται, τεταίοις
ταῖς.

SECTIO VII. 185

præcisus fuerit, neque auge-
tur, neque coalescit.

29. Alba pituita vexato, si
vehemens alvi profluvium suc-
cedat, morbum solvit.

30. Quibus per alvi proflu-
via spumosa sunt alvi excre-
menta, iis ea ex capite defluunt.

31. Quibus per febres sedi-
menta hordei rosti non exa-
moliti crassioribus frustulis si-
mililia in urinis contingunt, lon-
gam fore ægritudinem denun-
tiant.

32. At quibus biliosa sedi-
menta, supra vero tenuia fue-
runt, acutum morbum signifi-
cant.

33. Quibus disparata sunt
excrementa, iis vehemens est in-

N

cor-

περὶ τὸν ἰσχυρὸν ἐν τῷ σώματι ὄντι.

λδ'. Οὐκ ὁσοῖσι ἐν τοῖσι ἔρρι-
σιν ἐφίστανται πομφόλυγες, νε-
φριπὰ σημαίνει καὶ μακρὴν καὶ
ἀρρωσίαν ἔσθαι.

λε'. Οὐκ ὁσοῖσι διὰ λιπαρὰ καὶ ὀπί-
σσω καὶ ἀδρόν, ταῦτοι νεφρι-
πὰ καὶ ὀξεία σημαίνει.

λς'. Οὐκ ὁσοῖσι διὰ νεφριπὰ
καὶ σιν ἔσθαι τὰ περιρρυμμένα
συμβαίνει σημεῖα, πόνοι τε
καὶ ἐκ τῆς μύας τοῦ ῥαχιαίου
γίνονται, καὶ μὲν καὶ ἐκ τῆς ἐξω τό-
που γίνονται, ἀπόστημα περιρρυ-
μμενόν ἐξω. καὶ δὲ μάλλον
καὶ πόνοι καὶ ἐκ τῆς εἴσω τόπου
γίνονται, καὶ τὸ ἀπόστημα περιρρυ-
μμενόν ἐξω.

SECTIO VII. 137

corpore turbatio.

34. Quibus in urinarum summo bullæ consistunt, renum morbum, eumque longum fore significant.

35. At quibus summa urina pinguis est, & conferta, iis renum morbum, eumque acutum significat.

36. Quibus vero renum vitio affectis prædicta signa contingunt, doloresque circa spinæ musculos fiunt, si quidem ad loca exteriora ferantur, abscessum extra foras expecta. Quod si dolores ad loca interna magis verant, abscessum quoque interius

N 2

rius

188 ΗΙΡΡ. ΑΡΗΘΡ.

χρῆστέ μοι μάλλον εἶσα.

λζ'. Οἷοι εἶμα ἰμύσιν,
ὡς μὲν ἀνὰ πυρετῶ, σωτήριον
εἰ δὲ ξυὺ πυρετῶ, κακόν. Δι-
εσπύειν δὲ τοῖσι ψυκτικαῖσι
καὶ τοῖσι συπλικαῖσι.

λη'. Κατάρροι ἐς τὴν ἀνω κοί-
τίαν ἐκπύονται ἐν ἡμέρῃσι εἴκο-
σι.

λθ'. Ἦν ἐρὸν εἶμα καὶ
θρόμβας, καὶ σεαυτέω ἐχθρὰ
καὶ ἐδυνάμει ἐμπίπτει ἐς τὸ πεί-
ρα καὶ τὸ ὑπογαστρικόν. καὶ τὴν
κτένα, γὰρ πρὶ τὴν κύστιν ἐκείνη
σημαίνει.

μ'. Ἦν ἡ γλῶσση ἰξαίφνης
ἐκσταθῆς ῥήνται, ἡ δὲ πλά-
κτεν

SECTIO VII. 189

ius potius futurum sperandum.

37. Qui sanguinem vomitione refundunt, siquidem citra febrem contingat, salutare, cum febre vero, malum. Curandum vero refrigerandi, & adstringendi vim habentibus.

38. Destillationes in superiorem ventrem, intra viginti diem in pus vertuntur.

39. Si quis sanguinem, & grumos meiat, & stranguria laboret, dolorque ad interfœminum, imum ventrem, & pectinem pertingat, partes ad vesicam pertinentes male affici significat.

40. Si lingua derepente incontinens, aut aliqua corporis

N 3

poris

πτόν πε τῷ σώματι, μελαγχολί-
κόν τὸ τοῦτο γίνεῖ.

μα'. Ἡ'ν ὑπερκαταδρομείων
οἷον πρισβυτέρων λυγρὸν ὀπιγίμται,
ἰα ἀκαθόν.

με'. Ἡ'ν πυρετὸς μετὰ δαπὶ χο-
λῆς ἔχῃ, ὅδατος πολλῆ καὶ θερ-
μῆ καταχεομένη καὶ τῇ κεφαλῇ,
λύσις τῆ πυρετῆ γίνεῖ.

μεγ'. Γυνὴ ἀμφιδέξιος ἔγι-
νεται.

μεδ'. Ο'κίστοι ἔμπυοι καίον-
ται, ἢ τίμνονται, ὡς μὲν τὸ
αὐτὸν καθερὸν ῥυθὸν καὶ λευκόν,
πυρετὴ γίνονται. ὡς δὲ ὑφαιμιν
καὶ βορβορῶδες, καὶ δυσωδίας,
ἀπώλλονται.

μεε'. Ο'κίστοι τὸ ἥπαρ διά-
πυον καίονται, ὡς μὲν τὸ
αὐτὸν

PHOL. Sæctio VII. 191

poris pars syderata evadat, id
utram bilem indicat.

41. Si senioribus ultra mo-
dum purgatis singultus accidat,
non bonum.

42. Si febris non ex bile or-
ta prehenderit, aqua calida, &
copiosa capiti effusa, fit febris
solutio.

43. Mulier ambidextra non
fit.

44. Suppurati cum urun-
tur, aut secantur, si pus pu-
rum, & album effluat, eva-
dunt: quod si subcruentum,
& cœnosum, & graveolens
fuerit, pereunt.

45. Qui ex purulento jeco-
re adurantur, ii ubi pus purum
N 4 fluxe-

πύον κρεθαρόν ρυή κ' αδύκον, πει-
 χίνοντα. ἐν χεῖρσι γὰρ τὸ πύον
 τετέοισιν ὄσιν. ὡς δὲ οἶον ἀμύρ-
 ρη ρυή, ἀπύλλω.

μς'. Ο'δύτας ὀφθαλμῶν, ἀ-
 κρητον ποτίζας κ' λήσας πολλὰ
 θυρμῶ, φλεβοτόμῃ.

μζ'. Ὑπερπῶντα ὡς βύξ
 ἔχῃ, ἀνέλπισός ὄσιν.

μν'. Στραγγήριον καὶ δυστα-
 ρίον θόρυξος κ' φλεβοτομὴν ἀφύ-
 τέρμεν δὲ τὰς εἴσω φλέβας.

μθ'. Ὑπὸ κινάγχῃς ἔχε-
 μένῳ, οἰδῆμα καὶ ἐρύθημα ἐν
 τῷ στήθει ἐπιχρυσόμενον, ἀγαθόν,
 ὅσα γὰρ πέπευ τὸ νόσημα.

γ'. Θ' ἀκό-

PHOL. SECTIO VII. 193

fluat, & album, supersunt,
quod pus in tunica ipsis con-
clusum sit. Sin vero qualis a-
murca fluat, pereunt.

46. Oculorum dolores ex-
hibita meri potione, & copio-
sa aqua calentis balneo, venæ
sectione curato.

47. Aqua inter cutem labo-
rantem si tussis detineat, despe-
ratus est.

48. Urinæ stillicidium (stran-
guriā vocant) & meiendi
difficultatem, vini meri potio,
& venæ sectio solvit. At se-
candæ sunt interiores.

49. In angina detento, si tu-
mor, & rubor in pectore con-
tingat, bonum: foras siqui-
dem morbus vertitur.

N s

Quil.

ι'. Ο'κόσισιν ἂν σφακιαδὶ
ὁ ἐγκέφαλος, ἐν τρεσὶν ἡμέρησιν
δοτόλλωται. ὡς δὲ ταύτας δια-
φύωσι, ὑγίαις γίνονται.

ια'. Πταρμὸς γίνεται ἐν
καφαλῇ, διαθρομωμένην τὴν
ἐγκέφαλον, ἢ διυγραινόμενην τὴν
ἐν τῇ καφαλῇ κινῆ. ὑπερχεῖται
γὰρ ὁ αἷρ ὁ ἐν κινῇ ἔξω. ψεφεί δὲ
ὅτι διὰ σπινῆς ἢ διέξοδος αὐτῷ ὅσῃ.

ιβ'. Ο'κόσισιν ἡταιρ πρεοδύ-
ια', τετίοις πυρετὸς ὀπιγλυό-
μοις λυγὴ τὴν ὀδύνην.

ιγ'. Ο'κόσισιν συμφέρεται αἵμα
ἐφαρμεινὴν ὑπὸ τῇ φλεβῶν, τετίοις
καὶ ἡτορ φλεβοτομεινὴν.

ιδ'. Ο'κόσισιν μετα-
ξὺ τῶν φρενῶν καὶ τῆς γασ-
τρὸς φλέγμα δοτοκλείεται,
καὶ

SECTIO VII. 195

50. Quibus cerebrum syde-
ratione tentatum est, intra tres
dies intoreunt. Quod si hos
fugerint, sani evadunt.

51. Sternutatio ex capite fit
non calefacto cerebro, aut per-
numectata capitis inanitate.
Aër enim intus contentus ex-
tra effunditur. Strepitum au-
tem edit, quod ei per angu-
stum sit transitus.

52. Quibus secur vehemen-
ter dolet, iis succedens febris
dolorem solvit.

53. Quibus sanguinem ex
venis detrahare convenit, iis ve-
re vena secanda est.

54. Quibus inter septum
transversum, & ventriculum
pituita concluditur, & dolo-
rem

κ, ὁδύκω παρέχῃ καὶ ἔχον διή-
 ϑονεῖς ἐξωτερικῶν τῶν κοιλιῶν, ἡ
 τέτοιαι κατὰ τὰς φλέβας ἐς τὴν
 κύκλῳ τραπίτος τῆ φλέγματος
 λύσις γίνεται τ' νόσος.

νε'. Οἰκίστοι αὖ τὸ ἥπα-
 ῦδατος πλησθέν εἰς τὸ ὀπίπλῳ
 ῖα γῆ, τετέοισιν ἡ κοιλία ὑδατο-
 ῖα μπιπλᾷ, καὶ ὀποθνήσκουσιν.

νε'. Α'λύκη, χάσμοι, φεί-
 χη, οἶτος ἴσος ἴσος πιόμβρος,
 λύσις τῶν νόσων.

νε'. Οἰκίστοι αὖ τῇ ἐν-
 ῖα φέμα γίνεται, τετέοισι δια-
 πυήσαντος καὶ ἐκτραγέτης λύσις ὁ
 νόσος.

νε'. Οἰκίστοι δ' αὖ ὁ ἐγ-
 κεφαλός σπειρῇ ὑπὸ πινός κα-
 φάσις, αἰάκη ἀφάνης γυί-
 ας

SECTIO VII. 197

exhibet, neque in alterum
ventrem viam habet, iis
venas in vesicam pituita
rta, morbi fit solutio.

§5. Quibus jecur aqua ple-
um in omentum eruperit, iis
inter aqua impletur, & mo-
antur.

§6. Anxietudinem, oscita-
onem, horrorem, vinum &
ali aqua temperatum epo-
m, solvit.

§7. Quibus in urinaria fi-
ula tuberculum innascitur,
o in pus verso, & rupto, do-
r solvitur.

§8. Quibus ex occasione a-
qua cerebrum concussum fue-
t, eos protinus voce defice-

ως παραχῆμα.

ιβ'. Τοῖσι σώμασι τοῖσιν ἡ
γὰρ τὰς σάρκας ἔχεισι, δὲ λιμοῖ
ἐμποιῇν. λιμὸς γὰρ ἐνερῆς τῶ
σώματι.

ιζ'. Οὐκ ἐν ὅλῳ τῷ σώ
ματι μεταβολαί, καὶ τὸ σῶμα
καταψύχει, καὶ πάλιν θερμαί
νεται, ἢ χεῖμα ἵπτερον ἐξ ἐπεί
ρου μεταβάλλῃ, μαῖκος τόσῃ ση
μαίνῃ.

ιζα'. Ἰδρῶς πολὺς, θερμὸς ἡ
ψυχρὸς, ῥίαν ἀφεί, σημαίνῃ ἡ
χρὶ πλησμονὴν ὑγροῦ. ἀπάχῃ
ἐν χεῖ τῷ μὲν ἰσχυρῷ, ἀνωθεν
τῷ δὲ ἀδυνεῖ, κάτωθεν.

ιζβ'. Οἱ πρῶτοι οἱ μὴ δια
λείποντες, ὡς ἰσχυρότεροι δια
πίπτει γένει, ἐπικίνδυν
191.

necesse est.

59. Corporibus humida car-
ne præditis famem inducere
convenit, fames siquidem cor-
pora exsiccat.

60. Ubi toto corpore muta-
tiones, & corpus universum
refrigeratur; rursusque incale-
fit, nec subinde calorem com-
mutat, morbi longitudo de-
nunciatur.

61. Sudor multus, calidus,
aut frigidus, semper fluens, hu-
moris copiam inesse significat.
Hæc igitur robusto quidem su-
perne, debili vero inferne de-
scenda.

62. Febres non intermit-
tentes si tertio die vehemen-
tiores evadant, periculo ob-
noxie.

200 HIPPOCRATES.

νοι. ὅτω δὲ ἂν τρόπῳ διαλείπω-
σι, σημαίνει ὅτι ἀκίνδυνοι.

ξγ'. Οὐκόποισι πυρετοὶ μα-
κροί, τετάρτοις ἢ φύματα, ἢ
τὰ ἄρθερα πόνοι ἐκτείνονται.

ξδ'. Οὐκόποισι φύματα μα-
κρά, ἢ ἐς τὰ ἄρθερα πόνοι ἐκ-
πυρετῶ γίνονται, ἔτσι σιτίσις
πλείοσι χέει.

ξε'. Ἡν τις τῷ πυρέσσοντι τῶ-
φάσι δίδωται, τῷ ἀπὸ ὑγμάνοντι ἰχθὺς
τῷ δὲ κάμνοντι ἰσσοῦς.

ξς'. Τὰ διὰ τὸ κύριον διαχω-
ρῶντα ἴσῃ δέῃ, εἰ οἷα τοῖς ὑγμάνον-
σιν ὑποχωρεῖ. τὰ ἥκιστα ἔστι ὁμοίαν
τετάρτοις, ταῦτα ἰσοπλάστει. τὰ ἔτι
ὁμοίαν

SECTIO VII. 201

noxia. Quoquo autem modo
intermiserint, periculum abesse
indicat.

63. Quos febres longæ exer-
cent, iis tubercula, vel in arti-
culis dolores innascuntur.

64. Quibus longa tubercu-
la, aut in articulis dolores ex
febre fiunt, ii copiosioribus ci-
vis utuntur.

65. Si febricitanti quis ci-
um exhibuerit, sano quidem
obur, & ægrotanti morbus.

66. Quæ per vesicam ex-
runtur spectare oportet, an
qualia sanis subeunt. Nam
quæ his minime sunt simi-
li, ea morbosiora. Quæ ve-
ro

ὁμοίαι τοῖσιν ὑγιάνουσιν, ἥμισυ
στρά.

ξζ'. Καὶ εἴπῃ τὰ ὑποχάρ-
ματα, ὡς ἰάσης εἶναι, καὶ μὴ
τῆσιν, ὑφίσταται οἷον ξύσμα
καὶ ὡς ὀλίγα ἢ, ὀλίγη ἢ ἔστος γί-
νεται. ὡς δὲ πολλὰ, πολλή· τὰ
οἷσι ξυμφέροι ὑποκαθῆναι
κοιλίῳ. ὡς δὲ μὴ καθελεῖν
ἔστας διδῶς τὰ ῥοφύματα,
ὅσω αἱ πλείους διδῶς, μᾶλλον β-
λάσκει.

ξη'. Οἷον αἱ κάτω ὡς μὲν
χωρὶς, ὅσοι χολῆς μελαίνης ὅ-
ς ὡς πλείους, πλείους, ὡς ἑλάσσων
ἑλάσσων ἢ ἔστος.

ξθ'. Αἱ ὅσοι χεῖμψες αἵ εἰς
πυρετοῖσι τοῖσι μὴ διαλείπουσι
πυρετοῖσι, καὶ αἵματόνδεις, καὶ χ

SECTIO VII. 203

sanis similia, minime mor-
sa.

67. Et quibus dejectiones,
confidere permiseris, neque
overis, veluti strigmenta
confident, & si paucae sunt,
levis est morbus, sin vero
multae, magnus, iis alvum in-
purgari conducit. Quod si
anime purgata alvo sorbitio-
exhibueris, quo plures de-
cis, eo magis nocebis.

68. Quae cruda deorsum se-
cunt, ab atra bile sunt, si plu-
ra: si pauciora, minor
morbus.

69. In febribus non in-
mittentibus excreationes li-
quas, cruentas, biliosas,
O 2 &

δις καὶ δυσώδεις πᾶσαι κακὰί
 ἀποχωρέονται διὰ κακῶς, ἀγαθαί
 καὶ κατὰ κοιλίῳ, καὶ κύστιν, καὶ ὅκνη
 αὐτῶν ἀποχωρέοντι μὴ κενεθαρμύ
 907, κακόν.

ο'. Τὰ σώματα καὶ ὅκνη τὰ
 ἀέλεται καὶ αἵματι, διὲρ ποιεῖται
 καὶ μὴ ἀνὰ βέλονται διὲρ ποιεῖται
 ψι, εἶσαι πλὴν κοιλίῳ. καὶ δὲ
 κατὰ, ὑγρῶν.

οα'. Ὑποπτος, ἀγρυπνίῳ, ἀμ
 φόπερα μᾶλλον ἢ μετρίῳ γινώ
 μερα, νύκτες.

οβ'. Εἴν τοῖσι μὴ διαλείπει
 πυρετοῖσι, καὶ τὰ μὴ ἴσω ψι
 κατὰ δὲ, τὰ δὲ ἴσω καίεται,
 διαφανὲς ἴχνη, θανάσιμον.

17:1

SECTIO VII. 205

graveolentes omnes malæ.
Cum vero probe secedunt, bo-
æ. Per alvum etiam, & vesi-
am, & ubicunque quod sece-
it substeterit minime purga-
um, malum.

70. Corpora cum quis re-
urgare velit, fluxilia reddere
oportet. Quod si supra fluxi-
lia reddere voles, alvus sisten-
a: si vero infra, humectan-
a.

71. Somnus, vigilia, utra-
que si modum excefferint, mor-
bus.

72. In febribus non inter-
mittentibus, si externa fri-
geant, interna vero urantur,
& febris detineat, lethale.

O 3

73. In

ογ'. Εἰ μὴ διαλείποιτι π
ρετῇ, ἡ χεῖλος, ἡ ῥίς, ἡ ὀφθα
λμοίς, ἡ ὀφρύς διασραγῇ, ἡ
βλέπη, ἡ μὴ ἀέθ, ἡ δὴ ἀδεν
εἶν, ὅ, π ἂν ταῦτάων γένηται, δι
νάσιμον.

οδ'. Εἰπὶ λελυκῶ φλέγματι
δρωψὶ ὑπὸ γίνετο.

οε'. Εἰπὶ διαρροίῃ δυσιντερίν.

ος. Εἰπὶ δυσιντερίῃ λεειν
εἶν ὑπὸ γίνετο.

οζ'. Εἰπὶ σφακλισμῶ ὅσ
στασις ὁσέκ.

οη'. Εἰπὶ ἄμυγρος ἐμέγ
φθόη, καὶ τῷ αὐτῷ κάθαρσις αἶμα.

οθ'. Οὐκοῖα καὶ ἐν τοῖς
κατὰ πλὴν κύστιν, καὶ τοῖσι κα
τὰ πλὴν κοιλίῳ ὑποχωρήματα
καὶ ἐ

SECTIO VII. 207.

73. In febre non intermit-
te, si labrum, aut nasus, aut
oculus, aut supercilium perver-
tatur, si neque videat, neque
audiat, & jam debilis sit, ho-
m quicquid acciderit, le-
tale.

74. Albæ pituitæ aqua inter
item succedit.

75. Ex alvi profluvio inte-
riorum difficultas.

76. Intestinorum difficul-
ti laxitas intestinorum suc-
cedit.

77. Ex syderatione os ab-
edit.

78. Ex sanguinis vomitio-
ne tabes, & puris per superiora
ergatio.

79. Qualia etiam quæ per
ficam, & alvum, & car-
s excernuntur, & sicubi
O 4 alias

καὶ ἐν τοῖσι καὶ τὰς σάρκας, καὶ
 ὡς ἄλλῃ τῇ φύσει ἐκβαίνει
 σῶμα. ὡς ὀλίγον, ὀλίγη ἢ ἔσται
 γίνεσθαι. ὡς δὲ πολὺ, πολλή· ὡς
 ὅτι πολὺ, θαλάσιμον τὸ τοῦτο.

ΚΦ

SECTIO VII. 209

Quas corpus à natura recesserit,
aspicere oportet. Si parum,
levius est morbus, si multum,
magnus, si admodum multum,
periculose istud est.

OS APHO-

Α' ΦΟΡΙΣΜΟΣ

Παρεμβεβλημένοι,

Η'

Τμήμα ὄγδοον.

Α'.

Οὕτως ἐκ τῶν παρα-
ράκοντα ἔτι φανερὰ
γίνεται, ὅτι πάντες οἱ ἄνθρωποι
γίνονται ἄνθρωποι καὶ
δυναστεύουσιν οἷσιν ἂν οἰκίᾳ τῆς φύ-
σεως καὶ τῆς ἡλικίας ἢ τοῦ σώματος.

Β'. Οὕτως ἐν τῇσιν ἀρρώ-
σιν οἱ ὀφθαλμοὶ καὶ ποικίλως
δακρύουσιν, ἀγαθόν. ὁ δὲ νόσος
ἢ αἰὶν ποικίλος, κακόν.

Γ'. Οὕτως ἐν τοῖς πυρε-
τοῖς.

APHORISMI

INTERIECTI,

seu

Sectio Octava.

I.

Qui seniores annis quadraginta phrenetici fiunt, non admodum convalescunt: minus enim periclitantur ii, quorum naturæ & ætati morbus fuerit familiaris.

2. Quibuscunque oculi in morbis lacrymantur voluntarie, bonum: quibus vero sine voluntate, malum.

3. Quibus in febribus quar-

πῶσι πενταταίοισιν ἔχουσιν αἶμα
ἐκ τῶν ῥινῶν ῥυή, πυκνόν.

δ'. Ἰδρωτες ἐν τῇσι κρο-
μοισιν ἡμέρησι γινόμενοι σφο-
δρῶς καὶ παχέες ὀπκίνδυνοι· οἱ ὡ-
μοί ἐκ τῆς μετώπης, ὡς περ ἐν
λαγμοῖς καὶ κρενοῖς· καὶ ψυχροί
σφοδρῶς καὶ πολλοί· ἀνάγκη
τοῦ τοιούτου ἰδρῶτος πορεύεσθαι μ-
τὰ βίης, καὶ πόνα ὑπερβολῆς,
ἐκ θλίψεως παλινθερίας.

ε'. Ἐπὶ χροῖα νουήματα
κοιλίας καταφορὰ, κακόν.

ς'. Ὅσοντα φάρμακα
ἵηται, σίδηρος ἵηται· ὅσοντα
σίδηρος ἐκ ἵηται, σπῆρ ἵηται
ἔστι δὲ σπῆρ ἐκ ἵηται, τα-

APHOR.
Co. 170
S E C T I O V I I I. 213

martanis sanguis è naribus
exerit, malum est.

4. Sudores in diebus judi-
torii oborientes, vehemen-
s, & veloces, periculosi sunt:
qui expelluntur ex fronte
velut guttæ & aquæ featurien-
s: & frigidi valde ac multi.
Necesse est enim ejusmodi su-
orem prodire cum violentia,
laboris excessu, ac expressio-
ne diuturna.

5. Ex morbo diuturno, alvi
mor, malum.

6. Quæcunque non fa-
ciunt medicamenta, ea fer-
rum sanat: quæ ferrum non
sanat, ea ignis sanat: quæ
ignis non sanat, ea incur-
abilia

τα γὰρ νομίζειν αἰάτα.

ζ'. Φθίσι· μάλιστα γί-
γνεται δὲ ὀκτωκαίδεκα ἐτῶ
μέχρι τελέκεται καὶ αἰετι.

η'. Τὰ δὲ κατὰ φύσιν γί-
γνόμενα κατὰ φύσιν, πάντα
μὲν ἰσχυρὰ, τὰ δὲ καὶ θανατώδεια·
δεύτερον δὲ, ὡς μὲν ἐν τῇ ὥρῃ
νεστέῃ, αὐτὴ ἡ ὥρῃ συμμάχῃ
τῇ νέτῳ, οἷον καύσας δίερος, ὑ-
δρόπικα χέμας. ὑπὸνικὰ γὰρ τὸ
φυσικόν, φοβερότερον δὲ ἀσλη-
νί.

θ'. Γλῶσσαι μέλαινα καὶ
αἰματώδης, εἴ τι τῶν τοιό-
των σημείων ἔπῃσι, μὴ σφό-
δρα

ia judicare oportet.

7. Tabes iis maxime ætati-
s fiunt, quæ à decimo octavo
et usque ad tricesimum quin-
m.

8. Quæ secundum naturam
tabem vergunt, omnia qui
m vehementia, quædam ve-
etiam lethalia. Secundum
tem erat, si eo tempore ægro-
t, quo tempus ipsum morbo
em fert, quemadmodum fe-
i ardenti æstas, hydropico
ems. id enim quod est à na-
ra victoriam obtinet, at sple-
plus affert timoris.

9. Lingua nigra atque
lenta, cum quid horum
norum abest, non admo-
dum

Ἰρα κακοί· δηλοῖ γὰρ ἵκτον σμικρο-
τέρων.

ε'. Ταῦτα μὲν οὖν ἐν τοῖς
πυρετοῖσιν ὁξείσι σημειῶται χεῖρ,
ἐπὶ τε μέλει δόποθ' ἴσκειν, καὶ ἐπὶ τε
συνθήσεσσι.

ια'. Οἱ ῥχες δεξιᾶς ψυχρὸς καὶ
σπασμώδης, θανατώδης.

ιβ'. Οἱ ὕχες μέλανες καὶ εἰς
δάκτυλοι τῶν χερῶν καὶ ποδῶν ψυ-
χροί, σπασμωγμένοι ἢ καθέμνοι,
ἐχθρὸς δὲ θάνατον δηλοῦσιν.

ιγ'. Τὰ χεῖλη πελιδνὰ, ἢ καὶ
δόποθ' ἴσκειν, καὶ ἐξισταμμένα,
καὶ ψυχρὰ, θανατώδεια.

ιδ'. Τὰ ὦτα ψυχρὰ, διαφα-
νῆα

SECTIO VIII. 217

dum malum *signum* : morbum
enim minorem significat.

10. Hæc igitur in febribus
acutis observare oportet, *ut*
noscamus quando quis moritu-
rus sit, & quando evasurus.

11. Testis dexter frigidus
convulsusque, mortiferum est.

12. Ungues nigri, & digi-
ti manuum ac pedum frigidi,
contracti vel remissi, mortem
proximam esse significant.

13. Labra livida, aut etiam
resoluta, & inversa, & frigi-
da, mortifera.

14. Aures frigida, pel-
luci-

εἰς σωισυλκίνα, διατατάδης
εἰς.

14'. Καὶ σκοποδινίαν καὶ δόπο-
στειφόμορος, καὶ ὕπνου καὶ κρού-
ματι πολλὰ κατεχόμενος, ἀνέλ-
πιστος.

15'. Καὶ βυστάσει ἀτρέμα,
καὶ ἄγνοίαν, καὶ μηδὲ ἀκέων, μηδὲ
ζωιεύς, διατατάδης.

16'. Μέλλει δὲ δόποθινίαν
ταῦτα σαφέστερα γίγνεται, καὶ
εἰ κοιλίᾳ ἐπαίρηται, καὶ φυ-
σῶν).

17'. Οἷος ὅτι τῷ θανάτῳ ἰάν τῷ
τῷ ψυχῆς διρμὸν ἐπατέλθῃ ἰώ-
τῷ ὁμφαλῇ, εἰς τὸ αἶμα τῶν φρενῶν
τέτον

SECTIO VIII. 219

lucida, contracta, lethales
sunt.

15. Et tenebrosa vertigi-
ne laborans, & lucem aver-
sans, & somno ac ardore
multo detentus, desperatus est.

16. Et qui paulatim rabie
agitari incipit, & non agno-
scit, neque audit, neque in-
telligit, exitio proximus est.

17. Morituri signa hæc
multo sunt manifesta, &
venter attollitur, atque infla-
tur.

18. Terminus vero mor-
tis est, cum animæ calor su-
pra umbilicum ad locum se-
pto transverso superiorem a-
scen-

P 2

scen-


τόπον. καὶ συγκραυθῇ τὸ ὑγρὸν ἅ-
 παν· ἐπεὶ δ' ἂν ὁ πνεύμων καὶ ἡ καρ-
 δία τῷ ἰκμάδι ἀποβάλλωσι τὴν
 δερμὶν ἀθροῦντος ἐν τοῖσι θανατώ-
 δουσιν τοποῖς, ἀποπνίει ἄθροον τὸ
 πνεῦμα τὴν δερμιν, ὁθενὼρ σιωῇσι
 τὸ ὅλον εἰς τὸ ὅλον. σάλιν τὸ μὲν
 διὰ τῆς σαρκῶν, τὸ δὲ διὰ τῆς ἐν
 κεφαλῇ ἀναπνοῶν, ὁθεν τὸ ζῶν
 κελευόμεν, ἀπολείπεται ἡ ψυχὴ τὸ
 τῷ σώματι σκῆνος. καὶ τὸ ψυχρὸν,
 καὶ τὸ θινιτὸν εἶδωλον ἅμα καὶ χολεῖν
 καὶ αἷματι καὶ φλέγματι καὶ σαρκὶ
 παρέδωκεν.

Τ Ε Λ Ο Σ.

SECTIO I. 221

ascendit, & omnis humor exu-
ritur. Cum autem pulmo &
cor calore in mortiferis locis
coacervato humorem amisc-
rint, caloris spiritus confertim
exhalat, cujus ope totum cum
toto compactum erat. Præter-
ea partim per carnes, partim
per capitis spiracula, unde vi-
vere dicimus, relinquens ani-
ma corporis domicilium, frigi-
dum & mortale simulacrum,
una cum bile, sanguine, pitui-
ta, & carne deditione reddit.

F I N I S.



Perutilis & luculenta
METHODUS,

Qua

Omnes in universum
HIPP. APHORISMI


*In gratiam tyronum studio-
forum in certam seriem secundum
diversas artis medicae materias, va-
rias medici actiones, ac omnes to-
tius corporis humani affectus
accuratè digesti ac dispo-
siti sunt,*

Opera ac studio

IOANNE ERNESTO SCHEFFLER,
Phil. & Med. Doct.



LUGDUNI BATAVORUM,
EX OFFICINÂ IOANNIS MAIRE,
MDCXXXIII.



METHODI APHORISMIS

HIPPOCRATIS.

adjunctæ

DISTINCTIO I.

Continens

Aphorism. ad Prognosin &
Diagnosin spectantes.

LIBELLUS Aphorismorum Hipp. de omnibus ferme medicis actionibus rationalem Medicum fundamentaliter instruere, cuilibet attentius eundem perlustranti, manifestum evadit. Cum autem Medici actiones, quas alias infinite videntur, ad

P 5 duos

duos praeipue dirigantur
 scopos, rerum nempe secun-
 dum naturam in subiecto
 suo conservationem, & pra-
 ter naturam ab eodem amo-
 tionem: maioris perspicui-
 tatis & distinctionis gratia,
 aphorismos, tam has quam
 illas Medici actiones diri-
 gentes, separatim ob ratio-
 nes in praefatione allatas pro-
 ponimus. Verum antequam
 rationalis Medicus auxilia
 ad finem consequendum ad-
 movere, atque ad operatio-
 nem ipsam accedere tentet,
 prius an affectus actiones
 respuat, vel recipiat per si-
 gna inquirat, de quibus se-
 quentes & idcirco primo lo-
 co

co dispositi aphorismi infor-
mant. itaque

Sec. *Aph.* *Fol.*

Prooemium operis.

1 *1* *3*
De signis Diagnosticis.

2	4	25
2	5	25
2	6	25
2	26	33
2	27	35
2	28	35
2	30	37
2	31	37
2	33	37
2	39	41
2	40	41
2	42	43
2	44	43
2	45	43
2	50	45

Sec.

228 METHODUS

<i>Sect.</i>	<i>Aph.</i>	<i>Fol.</i>
2	53	47
2	54	49
4	30	87
4	33	87
4	36	89
4	38	91
4	41	93
4	42	93
4	45	93
4	51	97
4	52	97
4	53	99
4	54	99
4	56	99
4	57	101
4	58	101
4	59	101
4	60	101
4	62	101
4	63	103
4	64	103
4	68	105
4	70	105

Et omnes reliqui usque ad finem sectiones quartæ.

Sect.

IN APHOR. HIPPOCR. 229

Fol.	Seç.	Aph.	Fol.
47	7	30	185
49	7	32	185
87	7	33	185
89	7	36	187
89	7	37	189
91	7	38	189
93	7	39	189
93	7	40	189
93	7	41	191
97	7	42	191
97	7	49	193
99	7	52	195
99	7	54	197
99	7	56	197
101	7	57	197
101	7	61	199
101	7	63	201
101	7	64	201
101	7	65	201
103	7	66	201
103	7	71	205

De signis Prognosticis.

1	12	13
2	5	25
		Seç.

230 METHODUS

Sect.	Aph.	Fol.
-------	------	------

2	13	27
2	23	33
2	24	33
2	27	35
2	28	35
2	33	37
2	44	43
4	11	77
4	21	83
4	22	83
4	23	83
4	24	85
4	25	85
4	26	85
4	27	85
4	28	85
4	29	87
4	30	87
4	35	89
4	37	91
4	40	91
4	43	93
4	44	93
4	46	95
4	47	95

Sect.

IN APHOR. HIPPOCR. 231

Sect.	Aph.	Fol.
4	48	95
4	49	97
4	50	97
4	55	99
4	61	101
4	65	103
4	66	103
4	67	105
5	1	113
5	2	113
5	3	113
5	4	113
5	5	113
5	6	115
5	7	115
5	8	115
5	9	115
5	10	117
5	11	117
5	12	117
5	13	117
5	14	119
5	15	119
5	71	151
7	1	177

Sect.

<i>Sect.</i>	<i>Aph.</i>	<i>Fol.</i>
7	2	177
7	3	177
7	4	177
7	5	177
7	6	177
7	7	179
7	8	179
7	9	179
7	10	179
7	11	179
7	12	179
7	13	179
7	14	181
7	15	181
7	16	181
7	17	181
7	18	181
7	19	181
7	20	181
7	21	183
7	22	183
7	23	183
7	24	183
7	25	183
7	26	183

et.

IN APHOR. HIPPOCR. 235

Sect.	Aph.	Fol.
7	27	183
7	28	185
7	29	191
7	41	191
7	42	191
7	44	191
7	45	195
7	50	197
7	55	199
7	60	207
7	74	207
7	75	

De signis è sputo.

1	12	13
4	47	95

De sudoribus.

4	36	98
4	37	91
4	41	91
4	42	93
4	56	99

Q

Sect.

234 METHODUS

Sect.	Aph.	Fol.
5	71	151
7	4	177
8	4	213

De Urinis.

4	69	105
4	70	105
4	71	105
4	72	107
4	74	107
4	75	109
4	76	109
4	77	109
4	78	109
4	79	111
4	80	111
4	81	111
4	83	111
7	31	185
7	32	185
7	33	185
7	34	187
7	35	185

Sect.

Sect. Aph. Fol.

De signis ex alvi fluxu.

2	14	29
2	15	29
2	20	31
4	21	83
4	23	83
4	24	85
4	25	85
4	26	85

De tempore futurae
criseos.

I 12 13

DISTINCTIO II.

Continens Aphorismos de
victus ratione.

*Recensiti aphorismi mor-
bi essentiam & conditionem
manifestarunt, quâ cogni-*

Q 2 tā

236 METHODUS

tâ deinceps sagax Medicus
curativos sibi scopos propo-
nere & id quod in agro se-
cundum naturam superest,
custodire aggreditur. Hoc
postremum fit conveniente
victus ratione, quam Hip-
poc. seqq. aphorismis docet.

De victu morbis conve-
niente.

Seç.	Aph.	Fol.
I	4	7
I	5	9
I	7	9
I	8	11
I	9	11
I	10	11
I	11	13
I	16	19
I	17	19
I	19	19

Seç.

IN APHOR. HIPPOCR. 237

Sett. Aph. Fol.

De victu ætatibus ac-
commodato.

I 13 15

I 14 15

De victu temporum
anni.

I 15 17

I 18 19

De qualitate, modo, quan-
titate, & aliis victus
conditionibus.

2 8 25

2 10 27

2 11 27

2 16 29

2 18 29

2 22 31

2 31 37

2 32 37

2 38 41

Q 3 Sett.

238 METHODUS

Sect. Aph. Fol.

De lacte.

5 64 145

De vino.

2 21 31

7 56 197

De aqua.

5 26 127

De siti.

4 19 18

5 27 127

DISTINCTIO III.

Continens aphorismos ad
generalem curandi ratio-
nem spectantes.

Cum boni Medici munus

sit

fit, non solum agrorum vi-
res custodire, verum etiam
hostes humanam naturam
infestantes depellere, huic
scopo bene administrando.
Medicus opus habet instru-
mentis, indicatione scilicet
curatoria & praeservatoria:
postremam hanc moderan-
tur aphorismi informantes,
quos, quae, qualia, quan-
tū, ubi, quomodo, & quan-
do evacuare vel revellere
oporteat, suntque

Señ. Aph. Fol.

De indicationibus ge-
neralibus.

1	3	5
1	19	19
2	20	35
	Q4	Señ.

240 METHODUS

<i>Sect.</i>	<i>Aph.</i>	<i>Fol.</i>
1	37	41
2	7	25
2	9	27
2	22	31
2	50	45
2	51	45
2	52	47
4	3	75
4	2	73
5	18	121
5	19	121
5	21	123
5	23	125
5	24	125
8	6	213

De purgatione in genere.

1	3	5
2	36	39
2	29	34
2	37	41
6	47	167

Sect.

Seç. *Aph.* *Fol.*
 Qualia & quæ purganda.

I	1	3
I	20	21
I	22	21
I	25	23
2	9	27
4	2	73

De quantitate purgandi.

I	23	21
---	----	----

De loco per quem purgandum.

I	21	21
4	6	75
4	7	75
4	8	77
4	9	77
4	12	77
4	13	79
4	14	79
4	15	79

Qs

Seç.

242 METHODUS

<i>Sect.</i>	<i>Aph.</i>	<i>Fol.</i>
4	16	79
4	17	81
4	18	81
4	19	81
4	20	81

De tempore purgandi.

1	24	23
2	29	35
4	4	75
4	5	75
5	10	77

De Prægnantium purgatione.

4	1	73
5	29	127
5	36	131

Iudicium ex purgatione.

4	19	81
7	25	183

Sect.

IN APHOR. HIPPOCR. 243

Sect. Aph. Fol.

De venæ sectione.

5	31	129
5	68	149
9	22	159
6	47	169
7	48	193
7	46	193

De cucurbitulis.

5	50	137
---	----	-----

DISTINCTIO IV.

Continens aphorismos explicantes affectus p. n. secundum ætates, ventos & anni tempora distributos.

Haftenus aph. qui ad generalem curationem pertinent

nere videntur contemplati-
sumus; Nunc omnium p.n.
affectuum, quorum in toto
hoc libello fit mentio, apho-
rismos, iuxta singulos, sin-
gularum partium, anni
temporum, ætatum &c.
morbos, certa serie dispo-
ne conabimur; Initium su-
mentes à morbis ætatum,
anni temporum &c. unde
sit.

Sect.	Hph.	Fol.
-------	------	------

De morbis ætatum.

2	39	41
2	54	49
3	18	61
5	9	115

De puerorum morbis.

3	24	67
		Sect.

IN APHOR. HIPPOCR. 245

Sect.	Aph.	Fol.
-------	------	------

3	25	67
---	----	----

3	26	67
---	----	----

3	28	69
---	----	----

De juvenum morbis.

3	27	69
---	----	----

3	29	71
---	----	----

De virorum morbis.

3	30	71
---	----	----

De senum morbis.

3	31	71
---	----	----

De mulierum morbis videatur infra titulus de affectibus uteri.

De temporis anni morbis.

3	1	49
---	---	----

3	4	51
---	---	----

3	8	53
---	---	----

3	19	63
---	----	----

Sect.

246 METHODUS

Sect. Aph. Fol.

De vernalibus morbis.

3	9	55
3	18	61
3	20	63

De æstivis morbis.

3	6	53
3	13	57
3	21	63

De autumnalibus morbis.

3	8	55
3	10	55
3	14	57
3	22	65

De hiemalibus morbis.

3	11	55
3	12	55
3	13	57
3	23	65

De affectibus à ventis.

3	5	51
4	7	53

Sect.

Rect.	Aph.	Fol.
3	8	33
3	14	57
3	16	59
3	17	61
3	15	59

DISTINCTIO V.

Continens aphorismos ad
febres spectantes.

*Vt rationalis Medicus cu-
rativis scopis satisfacere, ma-
terias medicas invenire, in-
ventis recte uti valeat: non
satis erit vires custodire, &
morbificas causas amovere,
sed & morbi speciem, & lo-
cum affectum exquisitè co-
gnitum habeat, necesse est.
Quod rectissime fiet, si de af-
fectibus tum corporis totius,
tum singularum partium
apho-*

248 METHODUS

aphorismos probe perspexerit. Hoc primum aphorismi de febribus, secundū sequentia maxima ex parte manifestabunt. Sinz ergo

Sect. Aph. Fol.

De febre continua.

3	21	63
4	43	93
4	46	95
4	47	95
4	48	95
4	49	97
4	50	97
4	56	99
7	72	205
7	73	207

De febre acuta.

1	14	17
2	19	31
2	23	31
3	7	53

Sect.

IN APHOR. HIPPOCR. 249

Sect.	Aph.	Fol.
3	9	55
3	11	55
4	37	91
4	66	103
5	64	145
6	54	173
7	1	177

De causone.

3	21	63
4	54	99
4	58	101
6	26	161

De febre intermittente.

1	11	13
1	12	13
4	30	87
4	43	93

De tertiana.

3	31	63
4	43	93
4	59	101

R

Sect.

250 METHODUS.

Secl. Aph. Folia

De quartana.

2	25	33
3	21	63
3	22	65
2	70	149

De quotidiana.

3	17	61
4	63	103

De febribus longis.

2	25	33
2	28	35
3	16	59
3	27	69
4	36	89
4	44	93
4	51	97
4	53	99
5	64	147

De sudore febrium.

1	12	15
---	----	----

Secl.

IN APHOR. HIPPOCR. 251

Sect.	Aph.	Fol.
3	21	61
4	36	89
4	37	91
4	56	99

De rigore februm.

4	29	87
4	46	95
4	58	101
4	63	103
5	17	119
5	20	121

De convulsione in febribus.

2	26	33
4	57	101
4	66	103
4	67	105
4	68	105
5	5	113
5	70	149

R 2

Sect.

De reliquis symptomati-
bus februm.

2	28	38
4	27	85
4	31	87
4	34	89
4	35	89
4	44	93
4	47	95
4	48	95
4	49	97
4	50	97
4	51	97
4	52	97
4	53	99
4	54	99
4	55	99
4	60	101
4	62	101
4	63	103
4	64	103
4	65	103
4	69	105

Sect.

IN APHOR. HIPPOCR. 253

Sec.	Aph.	Fol.
4	70	105
4	73	107
5	55	139
6	26	161
6	44	167
6	50	171
6	54	173
7	52	195
7	65	201

DISTINCTIO VI.

Continēs aphorismos spectantes ad morbos singulorum partium, à vertice ad plantas pedis.

Vt partes corporis, ita & morbi in externos & internos dividuntur. Aphorismos pertinentes ad hos, praesenti, ad illos, sequenti dist-
R 3 *fin.*

254 METHODUS

functione subicimus.

Sect. Aph. Fol.

De dolore capitis.

3	13	57
3	17	61
4	70	105
5	23	123
5	28	127
5	64	145
5	68	149
6	10	155
6	51	171

De lethargo, cataphora & catocoe &c.

2	3	25
3	13	65
3	30	71

De Apoplexia.

2	42	43
3	16	59
3	23	65
3	2	3

Sect.

IN APHOR. HIPPOCR. 255

Sect.	Aph.	Fol.
3	31	73
6	51	171
6	57	173

De Melancholia & furore.

3	20	63
3	21	65
4	9	77
6	11	155
6	21	159
6	23	159
6	56	173
7	5	177
7	40	189

De Phrenitide.

3	30	71
4	72	107
7	12	179
8	1	211

De Delirio.

2	2	23
	R 4	Sect.

256 METHODUS

<i>Señ.</i>	<i>Aph.</i>	<i>Fol.</i>
6	35	171
7	7	179
7	10	179

De desipientia.

7	5	177
7	9	179
7	14	179
7	18	181

De Epilepsia.

2	45	43
3	16	59
3	20	63
3	22	65
3	29	71
5	7	115

De convulsione & nervo- rum cæteris quibusdam affectibus.

2	46	33
3	25	67
4	16	79
		<i>Señ.</i>

IN ARMOR. HIPPOCR. 257

Sect.	Aph.	Fol.
4	57	101
4	66	103
4	67	105
4	68	105
4	1	113
4	2	113
4	3	113
4	4	113
4	5	113
4	6	115
4	22	123
4	25	125
4	76	139
4	65	147
4	70	149
6	39	165
6	56	173
7	9	179
7	10	179
7	13	179
7	18	181
7	25	183
De stupore.		
7	14	179
7	40	189
	R s	Sect.

258 METHODUS

Sect. Aph. Fol.

De oculorum affectibus.

3	14	57
3	17	61
3	31	71
4	49	97
4	52	97
6	31	163
6	52	171
7	3	177
7	46	193
8	2	211
8	15	219

De aurium affectibus.

3	5	51
3	17	61
3	21	65
3	24	67
3	31	71
4	13	85
4	49	97
4	60	101
6	10	155

Sect.

IN APHOR. HIPPOCR. 259

Sect. Aph. Fol.

8 14 217

8 14 219

De narium affectibus.

2 40 41

3 13 57

3 14 59

3 20 63

3 27 69

3 31 71

4 25 85

4 27 85

4 49 97

4 60 101

4 74 107

5 33 129

6 2 151

De sternutatione.

5 35 131

6 13 157

7 58 195

Sect.

260 METHODUS

Sect. Aph. Fol.

De gravedine.

2	40	41
---	----	----

De oris & linguæ affectibus.

3	21	63
3	24	67
6	32	163
7	40	189
8	9	215

De dentium affectibus.

3	25	67
4	53	99
5	18	121

De gingivarum & labiorum affectibus.

4	49	97
8	13	217

Sect.

IN APHOR. HIPPOCR. 261

Sect. Aph. Fol.

De gutturis affectibus, angina, asthma &c.

2	43	43
3	16	59
3	20	63
3	22	65
4	34	89
4	35	89
6	37	165
6	46	169
7	49	193
5	10	117

De pectoris & pulmonis affectibus, & primo de anhelitu.

3	23	65
2	29	71
2	31	71
4	34	89
4	50	97
4	68	105
		Sect.

262 METHODUS.

Sect. Aph. Fol.

De tussi & raucedine.

2	40	41
3	5	51
3	13	57
3	20	63
3	24	67
3	31	71
4	54	99
5	24	125
6	35	165
6	46	169
7	46	193

De vocis latione.

5	5	113
6	51	171
7	58	197

De peripneumonia.

4	23	65
3	30	71
6	16	157

Sect.

IN APHOR. HIPPOCR. 263

Sect.	Aph.	Fol.
-------	------	------

7	11	179
---	----	-----

7	12	179
---	----	-----

De Empyemate.

5	8	115
---	---	-----

5	10	117
---	----	-----

5	15	119
---	----	-----

5	65	147
---	----	-----

6	27	161
---	----	-----

6	41	167
---	----	-----

7	15	181
---	----	-----

7	38	189
---	----	-----

7	44	191
---	----	-----

De phthisi seu tace.

3	13	57
---	----	----

3	22	65
---	----	----

3	29	71
---	----	----

4	18	77
---	----	----

5	9	115
---	---	-----

5	11	117
---	----	-----

5	12	117
---	----	-----

5	13	117
---	----	-----

5	14	119
---	----	-----

Sect.

264 METHODUS

<i>Scil.</i>	<i>Aph.</i>	<i>Fol.</i>
5	15	119
5	64	115
6	12	115
7	16	181
8	7	215
8	8	215

De pleuritide.

1	12	15
3	23	65
5	8	115
5	15	119
6	5	153
6	16	157
6	33	193
7	11	75

De sputo sanguinis.

3	29	71
4	25	85
5	13	117
6	10	155
7	15	181
7	37	189
		<i>Scil.</i>

IN APHOR. HIPPOCR. 265

Sect. Aph. Fol.

De cordis affectibus.

2	36	39
2	41	41
4	17	31
5	56	39
7	8	179

De mammarū affectibus.

5	37	131
5	38	131
5	39	133
5	40	133
5	50	137
5	52	137
5	53	139

De ventriculi affectibus.

1	2	3
1.	15	37
2	21	31
4	65	103
6	7	153
6	18	157
	S	Sect.

Sect.	Aph.	Fol.
-------	------	------

7	54	195
7	6	177
8	17	219

De siti.

		81
4	19	97
4	48	99
4	54	127
5	27	145
5	64	

De vomitu.

	2	3
1	21	63
3	24	67
3	4	75
4	6	75
4	7	75
4	8	77
4	12	77
4	13	79
4	17	81
4	18	81
4	22	85
4	25	85

Sect.

IN APHOR. HIPPOCR. 267

Sect.	Aph.	Fol.
5	32	129
6	15	157
7	3	177
7	8	179
7	10	197
7	30	189
7	70	205

De singulru.

5	3	113
5	4	113
5	58	141
6	13	157
6	39	165
7	3	177
7	10	179
7	17	181
7	41	191

De hypochondriorum
affectibus.

4	64	103
4	73	107
5	64	145
6	40	165
	S 2	Sect

268 METHODUS

Sec. Aph. Fol.

De hepatis affectibus.

5	58	141
6	18	159
6	42	167
7	17	181
7	45	191
7	55	197

De hydropc.

3	22	65
4	11	77
6	8	155
6	14	157
6	27	161
6	35	165
7	5	177
7	55	197

De icteritia.

4	62	101
4	64	103
5	72	151
6	42	167

De lienis affectibus.

3	22	65
---	----	----

Sec.

IN APHOR. HIPPOCR. 269

Sect. Aph. Fol.

6 43 167

6 48 169

De alvi profluviis.

2 14 29

3 16 59

3 25 67

3 30 71

4 21 83

4 22 83

4 23 83

4 24 85

4 26 85

4 28 85

5 12 117

5 14 119

5 34 129

5 65 147

6 3 153

6 15 157

6 16 157

6 17 157

6 32 163

6 43 167

6 48 169

6 53 171

S 3 Sect.

270 METHODUS

Sect.	Aph.	Fol.
-------	------	------

7	25	177
7	23	183
7	29	185
7	30	185
7	75	207
7	76	207
8	5	213

De dysenteria.

4	24	85
4	26	85
6	43	267
7	75	207
7	76	207

De lienteria.

4	12	77
6	1	151
6	15	157

De iliaca passione.

3	22	65
6	44	167
7	10	197

Sect.

IN APHOR. HIPPOCR. 27¹

ed. Aph. Fol.

De dolore ventris.

4	11	77
4	65	103
6	5	153
6	7	153
6	40	165
7	22	137
7	26	183
7	39	189

De tenesmo.

7	27	183
---	----	-----

De ani affectibus & hæ-
morrhoidibus.

3	20	71
4	25	85
6	11	155
6	12	155
6	21	159

De renum affectibus.

3	31	71
4	75	109
	S 4	Sec.

272 METHODUS

<i>Sect.</i>	<i>Aph.</i>	<i>Fol.</i>
4	76	109
4	78	109
5	58	141
6	6	153
6	11	155
7	34	187
7	35	187
7	36	187

De vesicæ affectibus.

3	5	51
3	16	59
3	22	65
3	31	71
4	69	105
4	70	105
4	71	105
4	72	107
4	73	107
4	74	107
4	75	109
4	76	109
4	77	109
4	79	111
4	80	111
4	82	111

Sect.

IN APHOR. HIPPOCR. 273

Secl. Aph. Fol.

4	83	111
5	22	123
5	58	141
6	6	153
6	18	157
6	44	167
7	32	185
7	34	187
7	35	187
7	39	189
7	48	193

De affectibus pudendorū.

3	21	65
4	82	111
5	22	123
5	62	143
5	63	145
6	19	159

De testibus.

8	11	217
---	----	-----

De affectibus uteri.

3	12	55
3	14	57
	55	807

274 METHODUS

<i>Sect.</i>	<i>Aph.</i>	<i>Fol.</i>
3	28	69
2	1	73
5	22	123
5	28	127
5	29	227
5	30	129
5	34	129
5	45	135
5	47	135
5	49	137
5	51	137
5	54	139
5	55	139
5	58	141
5	62	143
<i>De menstribus.</i>		
5	32	129
5	33	129
5	36	131
5	39	133
5	50	137
5	56	139
5	57	141
5	60	141
5	61	143
		<i>Sect.</i>

IN APHOR. HIPPOCR. 275

Sect.	Aph.	Fol.
6	29	161

De conceptu.

§	39	133
§	41	133
§	42	133
§	43	133
§	46	145
§	59	141
§	61	143

De abortu.

§	31	129
§	37	131
§	38	131
§	44	133
§	45	235
§	55	139
7	27	183

De foetu & partu.

§	35	131
§	48	137
§	52	137
§	53	139
§	55	139
§	60	141

Sect.

276 METHODUS.

Sect. Aph. Fol.

De articulorum affectibus.

3	46	43
3	16	59
3	20	63
3	31	71
4	20	81
4	31	87
4	32	87
4	33	87
4	44	93
4	45	93
4	74	107
5	25	125
6	28	161
6	29	161
6	30	163
6	46	169
6	49	169
6	55	173
6	59	175
6	60	175

De digitis & unguibus.

8	12	217
		D 1.

IN APHOR. HIPPOCR. 277

DISTINCTIO VII.

Continēs aphorismos spectantes ad morbos qui externi dicuntur.

Nec satis est ad internos solum morbos pertinentes aphorismos probè cognitos habere, sed ut curativis scopis omni ex parte satis fiat, etiam ii qui de morbis externis informant, continenter in conspectu habendi: suntque

Sect. Aph. Fol.
De capillorum affectibus.

5	11	117
---	----	-----

6	28	161
---	----	-----

6	34	163
---	----	-----

De pustulis.

3	20	63
---	----	----

6	9	155
---	---	-----

Sect.

278 METHODUS.

Sect.	Aph.	Fol.
6	9	155

De tumoribus præter naturam.

4	34	89
4	35	89
5	25	125
5	65	147
5	66	147
5	67	149
5	37	165
7	49	193

De inflammatione.

3	24	67
3	23	125
5	58	141
6	40	165

De Erysipelate.

5	23	125
5	43	133
6	25	161
7	19	181
7	20	181

De sphacelo & gangræna.

7	2	187
---	---	-----

Sect.

IN APHOR. HIPPOCR. 279

<i>Sect.</i>	<i>Aph.</i>	<i>Fol.</i>
7	50	195
7	77	207
	De cancro.	
9	38	165
	De herpete.	
5	22	123
	De strumis.	
3	26	67
	De bubonibus.	
4	55	99
	De tuberculis.	
2	15	29
3	29	63
3	26	67
4	44	93
4	45	93
4	82	111
7	8	179
7	57	197
	De Verrucis.	
3	26	69
	De Vulneribus.	
5	2	113
	<i>Sect.</i>	

280 METHODUS

Sect. Aph. Fol.

De vulneribus.

5	2	113
5	66	147
6	18	157
6	19	159

De abscessu.

4	31	87
4	44	93
7	36	189

De ulceribus.

3	20	63
3	22	65
3	24	67
4	75	109
5	20	121
5	21	121
5	22	123
5	23	125
6	4	153
6	8	155
6	45	169
7	21	181

De ossium fracturis.

5	22	123
---	----	-----

F I N I S.

